

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص آریفای | آریپپرازول

یکی از محصولات مشهور شرکت داروسازی کیش مدیفارم قرص آریفای و یا Aripiprazole قرص محسوب می‌شود. این محصول دارویی به شکل قرص در بلیسترهای ۱۰ عددی و در دوزهای ۵ میلی‌گرم، ۱۰ میلی‌گرم و ۱۵ میلی‌گرم تولید شده است.

آریپپرازول Aripiprazole یک آنتی‌سایکوز آتیپیکال و یا نسل دوم به شمار می‌آید و مکانیسم اثر دقیق این دارو مشخص نیست. ولی عملکرد آن را می‌توان به فعالیت پارشیال آگونیستی در گیرنده‌های دوپامین ۲D و سروتونین ۵-HT و نیز فعالیت آنتاگونیستی در گیرنده‌های ۵-HT نسبت داد.

فواید آریپپرازول نسل ۲ نسبت به نسل‌های ۱ آنتی سایکوتیک

قرص آریفای همان‌طور که اعلام شد، یکی از محصولات درمانی اعصاب و روان مربوط به نسل ۲ به شمار می‌آید. ماده فعال این محصول دارویی آریپپرازول بوده و نام تجاری آن قرص آریفای است. از انواع مزیت و فواید آریپپرازول نسل ۲ آنتی سایکوتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بهبود عملکرد شناختی
- اثربخشی موثرتر، عمیق‌تر و بهتر
- در بر داشتن دامنه بیشتری از درمان‌ها
- عوارض جانبی کمتر (کاهش خطر ابتلا به دیسکینزی دیررس و کاهش عوارض خارج هرمی)
- مشهورترین محصولات رایج ضد روان‌پریشی نسل ۲ کوئمایند (کوئتیاپین)، پالپیریدون، ریسپریدون و اولانزاپین هستند.

موارد مصرف قرص آریفای

قرص آریپپرازول با کنترل میزان هورمون‌های سروتونین و دوپامین در مغز از بروز رفتارهای کنترل نشده، جلوگیری می‌کند. به طور کل موارد مصرف قرص آریفای را می‌توان به صورت زیر شمرد:

- کاهش تحریک‌پذیری در افراد دارای اوتیسم
- درمان و بهبود علائم ناشی از مانیای دو قطبی (بایپولار)
- کنترل و بهبود افسردگی ماژور و اختلالات ناشی از MDD
- آریپپرازول و اضطراب، مشکلات ناشی از اضطراب‌های اجتماعی

- درمان اختلالات تیک وابسته به سندرم تور (Tourette's Syndrome)
- بهبود و درمان نشانه‌های به وجود آمده از اختلالات اسکیزوفرنی و روان گسیختگی
- تجویز قرص آریفای به عنوان درمان ترکیبی به منظور بهبود وسواس فکری و یا OCD

عوارض جانبی قرص آریپیپرازول

قرص آریفای و یا آریفای مانند بسیاری از داروهای دیگر ممکن است، عوارضی را به همراه داشته باشد. این مشکلات می‌تواند وابسته به سن، جنسیت، وضعیت سلامتی فرد و داروهای در حال مصرف باشد. از عوارض جانبی قرص آریپیپرازول و یا آریفای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پر خاشگری
- علائم سکته مغزی
- دشواری در بینایی
- بی‌قراری در حرکت
- دیسکینزی دیر رس
- میل شدید به خودکشی
- استخوان درد و سر درد
- بروز استرس و اضطراب
- اختلال در خواب و بی‌خوابی
- گرفتگی بینی و سختی در تنفس
- حالت تهوع، اسهال و یا یبوست
- اختلالات نعوظ و مشکلات جنسی
- بی میلی شدید به غذا و کم اشتها
- افزایش فشار خون و یا افت فشار خون شدید
- تغییرات در میزان تری گلیسیرید و کلسترول بالا
- بثورات پوستی، خارش، قرمزی، التهاب و تورم در سطح پوست
- تغییرات در متابولیسم بدن و به دنبال آن افزایش وزن و میل شدید به پر خوری

اگر هرکدام از علائم بالا بعد از مصرف قرص آریفای به صورت حاد و شدید اتفاق افتاد، سریعاً به پزشک متخصص و یا اورژانس مراجعه بفرمایید. عدم پیگیری عوارض ناشی از مصرف قرص آریپیپرازول به وجود آمده حتی ممکن است خطر مرگ را در بر داشته باشد.

موارد منع مصرف قرص آریفای | آریپیپرازول

همان‌طور که گفته شد قرص آریفای می‌تواند عوارضی را به همراه خود داشته باشد. اگرچه این دارو به بهبود وضعیت بسیاری از افراد کمک می‌کند، اما برای همه توصیه نمی‌شود. مشکلات و بیماری‌های زمینه‌ای از مهم‌ترین علل، انتخاب یک دارو به حساب می‌آیند. در ادامه به موارد منع مصرف قرص آریپیپرازول پرداخته‌ایم:

- افراد مسن بالای ۶۵ سال با سابقه زوال عقل و یا نشانه‌هایی از آلزایمر
- حساسیت به قرص آریپیپرازول و مواد غیر فعال این محصول دارویی
- داشتن بیماری قلبی ایسکمیک، آریتمی و نارسایی‌های قلبی
- افراد با سابقه بیماری سندرم بدخیم نورولپتیک
- بیماری‌های قلبی_عروقی و مغزی_عروقی
- کاهش حجم خون قابل گردش در بدن
- سابقه اعتیاد به الکل و مواد مخدر
- افراد مبتلا به بیماری پارکینسون
- ناهنجاری‌های رفتاری و حرکتی
- از دست دادن زیاد آب بدن
- سابقه انفارکتوس میوکارد
- داشتن سابقه صرع

تداخلات دارویی قرص آریفای و یا آریپیپرازول

مهم‌ترین نکته‌ای که زمان مراجعه به متخصص مغز و اعصاب باید به ایشان اطلاع دهید، داروهایی است که در حال مصرف آن‌ها هستید. مصرف همزمان برخی از داروها می‌تواند مشکلات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و یا عوارض داروها را تشدید کند. افزایش، کاهش و بروز عوارض جدید از علائم تداخلات دارویی به شمار می‌روند. برخی از تداخلات دارویی قرص آریپیپرازول (آریفای) با داروهای زیر رخ می‌دهند:

- داروهای ضد افسردگی مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) و مهارکننده‌های بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین (SNRIs) مانند فلوکسیتین، ونلافاکسین و پاروکستین
- محصولات دارویی کاهش‌دهنده و یا افزایش‌دهنده فشار خون مانند هیدروکلروتیازید
- داروهای ضد تشنج مانند فنی توئین یا کاربامازپین
- داروهای متعادل کننده ضربان قلب مثل کینیدین
- ضد قارچ‌هایی نظیر کتوکونازول و ایتراکونازول

- برخی از آنتی هیستامین‌ها مانند کلرفنیرامین
- داروهای موثر بر سیستم قلبی عروقی
- مسکن‌های میگرن مانند سوماتریتان
- انواع مورفین‌ها و کدئین‌ها
- الکل و مشتقات آن
- فوسیدیک اسید
- اورفنادرین
- لیتیوم

هشدارها و نکاتی در مورد مصرف قرص آریفای | آریپیپرازول

بخش هشدارها و موارد احتیاط یکی دیگر از مهم‌ترین قسمت‌های توضیحات در بروشور محصولات است. شاید برخی موارد از نظر شما بدیهیات باشند، اما بهتر است به یاد داشته باشید عدم رعایت همین نکات کوچک می‌تواند خطرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشند. از جمله موارد احتیاط قرص آریفای موارد زیر به شمار می‌روند:

- اگر یک دوز از قرص آریفای را فراموش کرده‌اید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر نزدیک به دوز بعدی است، تا زمان مقرر صبر کنید و سپس مجدد شروع به میل قرص آریپیپرازول در زمان معین بفرمایید. از مصرف چند دوز متفاوت دارو و یا استفاده از چند قرص آریفای به طور همزمان جدا خودداری بفرمایید.
- قرص آریفای را در جای خشک و خنک دور از نور آفتاب و دسترس کودکان نگهداری بفرمایید. بهترین دما برای نگهداری قرص آریپیپرازول دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد است.
- اثرگذاری قرص آریپیپرازول در هر شخص متفاوت بوده، اما معمولاً پس از چند هفته اثرات مثبت این محصول دارویی مشهود می‌شوند.
- قطع ناگهانی قرص آریفای به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود چرا که احتمال دارد منجر به بروز علائم ترک و یا عود بیماری شود. قطع مصرف قرص آریپیپرازول باید تحت نظر پزشک و به تدریج انجام شود.
- قرص آریفای برای درمان طولانی مدت تجویز می‌شود. در صورت داشتن حساسیت و یا بروز عوارض جانبی شدید و ماندگار، ممکن است پزشک متخصص اعصاب و روان به شما محصول دارویی دیگری را توصیه کند.

- فرد مصرف‌کننده قرص آریفای باید به صورت روتین با پزشک معالج خود ملاقات کند تا اثربخشی و ایمنی درمان مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز دوز دارو و نحوه مصرف آن تنظیم شود.
- انجام آزمایش‌های دوره‌ای در طی درمان بسیار حائز اهمیت است. برخی از فاکتورهای خون باید به صورت روتین کنترل شوند.
- قرص آریپپرازول معمولاً وابستگی و اعتیاد را به همراه ندارد. فقط باید به یاد داشته باشید به هیچ عنوان تجویزهای خودسرانه انجام ندهید و کاملاً طبق دستورات پزشک معالج از قرص آریفای استفاده بفرمایید.
- در بسیاری از موارد اگر فرد دچار OCD و یا وسواس فکری باشد به عنوان یک درمان کمکی و ترکیبی قرص آریپپرازول تجویز می‌شود. قرص آریفای برای وسواس فکری به تنهایی توصیه نخواهد شد، مگر به تشخیص متخصص معالج شما. قرص آریپپرازول با متعادل کردن هورمون‌های مغز می‌تواند در کاهش علائم ناشی از وسواس فکری جلوگیری کند. قرص آریفای به منظور درمان وسواس، معمولاً همراه با درمان‌های دیگر مانند روان‌درمانی شناختی-رفتاری (CBT) توصیه خواهد شد.
- مهم‌ترین نکته در خصوص زمان مصرف قرص آریپپرازول (آریفای) ثابت بودن زمان است. یعنی این دارو باید به صورت روتین در روز و یا در شب استفاده شود. بهتر است در خصوص زمان مصرف با پزشک معالج خود نیز مشورت بفرمایید.
- به یاد داشته باشید قرص آریفای ممکن است باعث خواب‌آلودگی فرد شود، بنابراین لازم است این محصول دارویی در زمان‌هایی که نیاز به تمرکز دارید مانند رانندگی و کار با ماشین‌آلات خطرناک را استفاده نفرمایید.
- افراد با بیماری‌های قلبی، کبدی و کلیوی حتماً باید زیر نظر متخصص قرص آریپپرازول را استفاده کنند.
- اگر قصد بارداری دارید، باردار و یا شیرده هستید یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین نقاط زندگی شما و فرزندتان به شمار می‌رود، مصرف هرگونه دارو خصوصاً داروهای اعصاب و روان، مکمل و گیاهان باید تحت نظر پزشک معالج شما باشد.
- مقدار مصرف قرص آریپپرازول، در درمان بیماری مانیا دو قطبی به صورت خوراکی، ۳۰ میلی‌گرم یک بار در روزهای آغاز درمان است.
- مقدار مصرف قرص آریفای در درمان بیماری‌های اسکیزوفرنی به صورت خوراکی ۱۰ الی ۱۵ میلی‌گرم است. افزایش دوز دارو ۱ قبل از هفته دوم درمان نباید صورت بگیرد.

- قرص آریپیپرازول را همراه با غذا و یا بدون آن می‌توانید میل کنید. بهتر است همراه با قرص آریفای یک لیوان پر از آب نیز بنوشید.
- مصرف قرص آریپیپرازول منجر به کاهش فشار خون می‌تواند بنابراین در زمان تغییر وضعیت از حالت درازکش و یا نشسته احتیاط کنید.
- این دارو می‌تواند بر میزان سطح قند خون تاثیر بگذارد.
- از آنجایی که مصرف قرص آریفای می‌تواند بر دمای بدن تاثیر بگذارد، در حین دوره درمان نباید در معرض گرمای زیاد و یا نور آفتاب بیش از حد قرار بگیرید.
- تاثیرات مثبت در حین بی‌ضرر بودن قرص آریپیپرازول بر روی کودکان هنوز اثبات نشده است.
- در تحقیقات انجام شده نشانه‌ای از عدم بارداری در آقایان و خانم‌ها در حین مصرف قرص آریفای وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

قرص آریفای با ماده فعال آریپیپرازول، همان قرص آریپیپرازول است که در دوزهای ۵ میلی‌گرم، ۱۰ میلی‌گرم و ۱۵ میلی‌گرم در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید شده است. این محصول دارویی یک آنتی سایکوز آتیپیکال و یا نسل ۲ به شمار می‌رود که مزایای بیشتری نسبت به داروهای اعصاب و روان نسل ۱ به حساب می‌آیند.

قرص آریپیپرازول به منظور بهبود و درمان اختلالات ناشی از اسکیزوفرنی، دو قطبی و سندروم تورِت توسط پزشک متخصص تجویز می‌شود. رعایت نکات مذکور، تداخلات دارویی، موارد منع مصرف و عوارض جانبی قرص آریفای از جمله مواردی هستند که باید به دقت مطالعه شوند.

قرص آریپیپرازول به عنوان یک درمان ترکیبی به افراد با مشکلات وسواس فکری نیز تجویز می‌شود. معمولاً این افراد به درمان‌های استاندارد OCD پاسخ مناسبی نداده‌اند.

به یاد داشته باشید، تمام موارد اعلام شده به منظور معرفی قرص آریپیپرازول کیش مدیفارم (آریفای) و اطلاع رسانی در خصوص این محصول دارویی بوده، بنابراین اصلاً نباید به این اطلاعات اکتفا کرد و در خصوص مصرف این دارو حتماً با پزشک متخصص و معالج خود مشورت بفرمایید.