



گروه دارویی کیش مدیفارم



قرص اکسفارم

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که جامعه امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، زوال عقل و آلزایمر است. این مشکل علاوه بر اینکه اعتماد به نفس فرد را می‌گیرد احتمال دارد خطرات جبران‌نکردنی در پی داشته باشد.

بعد از رصد و پایش وضعیت و سلامتی فرد توسط پزشک معالج و حصول اطمینان از این عارضه معمولاً پزشک متخصص برخی از ورزش‌ها، تغذیه مناسب، سبک زندگی خوب و داروها را معرفی می‌کند.

اگرچه در حال حاضر هیچ راه‌حل قطعی برای درمان آلزایمر ثابت نشده اما یکی از بهترین این داروها به منظور کنترل نشانه‌های زول عقل ریواستیگمین (Rivastigmine) به حساب می‌آید.

این ترکیب دارویی با مهار آنزیم استیل‌کولین استراز، سطح این نوروترانسمیتر حیاتی را در مغز افزایش می‌دهد و از این طریق به بهبود عملکردهای شناختی کمک می‌کند.

قرص اکسفارم در دوزهای ۱،۵ میلی‌گرم، ۳ میلی‌گرم، ۴،۵ میلی‌گرم و ۶ میلی‌گرم در شرکت داروسازی کیش مدیفارم با مواد فعال ریواستیگمین فرموله شده است.

ریواستیگمین در سراسر جهان با فرمت‌های قرص خوراکی، محلول مایع خوراکی، پچ‌های ترانس درمال یا پوستی و کپسول خوراکی تولید می‌شود.

اکسفارم از نظر طبقه درمانی و دسته دارویی از داروهای ضد زوال عقل، کولینرژیک و پاراسمپاتومیمتیک به حساب می‌آید و از طریق ادرار دفع می‌شود.

همان‌طور که گفته شد در شرکت داروسازی کیش مدیفارم این محصول دارویی به صورت قرص فرموله می‌شود اما به اشتباه بسیاری فکر می‌کنند کپسول اکسفارم تولیدی کیش مدیفارم است.

موارد مصرف اکسفارم

قرص اکسفارم با دوزهای متفاوتی فرموله شده که با توجه به شدت بیماری فقط توسط پزشک متخصص تجویز می‌گردد.

پیشنهاد می‌شود اکسفارم صبح ناشتا همراه با یک لیوان پر از آب میل شود و معمولاً این دارو تا ۱۰ ساعت اثرگذاری دارد، البته میزان ماندگاری تاثیر اکسفارم کاملاً وابسته به شدت بیماری، نوع بیماری و دوز مصرفی دارو است.

در ادامه به ذکر برخی از موارد مصرف قرص اکسفارم پرداخته‌ایم:

- درمان دمانس و دمانس ناشی از پارکینسون
- بهبود و درمان بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط
- کنترل و بهبود بیماری پارکینسون خفیف تا متوسط (بهبود حافظه و تمرکز)
- بهبود زوال عقلی_عروقی (زوال عقل ناشی شده از مشکلات عقلی_عروقی)

موارد منع مصرف اکسفارم

اگرچه داروها به منظور درمان و کنترل بیماری‌ها تولید می‌شوند اما بسیاری از آن‌ها باید تحت نظارت پزشک متخصص مصرف شوند چرا که در صورت عدم پیروی از دستورات پزشک و یا مصرف خودسرانه می‌توانند عوارض ناخواسته‌ای را به همراه داشته باشند.

دکتر معالج با بررسی و پایش شرایط سلامتی و جسمانی فرد، سن، جنسیت، داروهای مصرفی، ژنتیک، شدت و نوع بیماری در بسیاری از موارد دارو درمانی را پیشنهاد می‌دهد.

لازم است در زمان مراجعه به دکتر حتما تمام شرایط خود را کامل اعلام بفرمایید تا بتوانید کمک بزرگی به حل مسئله و معضل پیش‌آمده داشته باشید.

اکسفارم همان‌طور که اعلام شد به منظور کنترل و درمان برخی از بیماری‌هایی نظیر آلزایمر و پارکینسون تجویز می‌شود اما مانند تمام داروهای دیگر ممکن است برای تمام افراد مناسب نباشد. ما در ادامه به ذکر شرایطی خواهیم پرداخت که فرد امکان استفاده از اکسفارم یا ریواستیگمین را نداشته باشد:

- حساسیت و یا آلرژی به ریواستیگمین یا مواد تشکیل‌دهنده اکسفارم
- افراد با سن کمتر از ۱۸ سال
- افراد با سابقه بیماری‌های قلبی_عروقی، مشکلات ریوی شدید از جمله انسداد ریه، اختلال دستگاه ادراری و مثانه، صرع و تشنج، بیماری‌های کلیه و مشکلات پوستی از جمله پسوریازیس و اگزما
- بارداری و شیردهی

تداخلات دارویی اکسفارم

اکسفارم یا ریواستیگمین می‌تواند با بسیاری از داروها خصوصا داروهایی که بر عملکرد مغز اثر می‌گذارند اختلال ایجاد کند. ضروری بوده که زمان مراجعه

به پزشک متخصص لیست کاملی از تغذیه و داروهایی که مصرف می‌کنید را اعلام بفرمایید.

علت‌های بروز تداخل دارویی معمولاً تداخل با جذب، متابولیسم و اثر داروها هستند و عواقبی از جمله کاهش اثربخشی، افزایش خطر بروز عوارض جانبی و سمیت داروها را به همراه دارند.

در ادامه به رایج‌ترین مواردی که سبب تداخل دارویی با اکسفارم می‌شوند را اعلام خواهیم کرد:

- داروهای ضد کولینرژیک مثل بنزوتروپین، دیفن هیدرامین و تری هگزفینیدیل
- داروهای ضد افسردگی از جمله سرتالین، پاروکستین و دولوکستین
- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن و ناپروکس
- دیگر داروهای مهارکننده کولین استراز (گالانتامین)
- نوشیدنی‌های الکلی و مشتقات آن
- گریپ فروت و آب آن
- داروهای بی‌هوشی

عوارض جانبی اکسفارم

داروها به منظور درمان، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها تولید می‌شوند اما ممکن است در ابتدای استفاده و یا تمام طول درمان فرد را دچار مشکلات دیگری بکنند.

برخی از این موارد پیش آمده قابل کنترل هستند اما برخی دیگر نیازمند بررسی‌های بیشتر پزشک، مراجعه به اورژانس و یا جایگزین کردن داروها هستند.

به یاد داشته باشید در صورتی که علائم و عوارض بعد از مصرف هر دارو شدت یافت حتماً در اسرع وقت باید آن را پیگیری بفرمایید. عوارض جانبی اکسفارم (ریواستگمین) را در ادامه به طور خلاصه بیان کرده‌ایم:

- افزایش فشار خون
- سر درد و سر گیجه
- بی اختیاری در ادرار
- انزوا، توهم و افسردگی
- کسل بودن، خستگی و ضعف
- مشکل در خواب و بی‌خوابی

- حالت تهوع، درد شکم و استفراغ
- افزایش تعریق و به دنبال آن کم آبی بدن
- لاغر شدن، بی میلی شدید و کاهش اشتها

نکاتی درباره اکسفارم

نگه داشتن دارو درون جعبه به همراه بروشور داخل آن یکی از مهم ترین نکاتی بوده که همیشه توصیه می شود. دستورات پزشک معالج، دکتر داروساز و پیروی از موارد ذکر شده در بروشور محصولات می تواند کمک بزرگی به کیفیت درمان داشته باشد.

ما در ادامه سعی کرده ایم رایج ترین سوالات شما را پاسخ دهیم و نکات بسیار مهم در مورد قرص اکسفارم را بیان کنیم:

- در ابتدای مصرف با توجه به اینکه ممکن است عوارضی از جمله غش اتفاق افتد حتما یک شخص نزدیک به خود را از مصرف این دارو مطلع بفرمایید.
- اکسفارم باید در جای خشک و خنک، دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی دارو به شدت اجتناب بفرمایید.
- به هیچ عنوان این دارو در دسترس کودکان قرار نگیرد.
- استفاده از ریواستیگمین سبب اختلال در تمرکز و بروز خواب آلودگی می شود، در زمان مصرف از اموری که نیاز به تمرکز دارند مانند رانندگی، درس خواندن و کار با ماشین آلات سنگین جدا خودداری بفرمایید.
- به هیچ عنوان قرص اکسفارم را خرد نکنید، نجوید و نشکنید، این محصول دارویی باید به طول کامل بلعیده شود.
- اکسفارم را با آب و انواع نوشیدنی غیر اسیدی می توانید میل بفرمایید. نوشیدن نوشابه، چای، قهوه و آب گریپ فروت همراه با ریواستگمین به هیچ وجه توصیه نمی گردد. این دارو به توصیه پزشک معمولا ۲ بار در روز استفاده می شود و می تواند همراه با غذا به منظور جلوگیری از حالت تهوع و مشکلات گوارشی میل شود.

نتیجه گیری

اکسفارم که از مواد اولیه ریواستگمین در دوزهای ۱/۵ میلی گرم، ۳ میلی گرم، ۴/۵ میلی گرم و ۶ میلی گرم در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید شده و در داروخانه های سراسر کشور به قیمت ارزان در دسترس است. این محصول

دارویی به منظور کنترل و درمان علائم بیماری‌هایی از جمله پارکینسون و آلزایمر فقط توسط پزشک متخصص تجویز می‌شود و به هیچ عنوان نباید از آن به طور خودسرانه استفاده کرد.

به یاد داشته باشید توضیحات اعلام شده به منظور معرفی بیشتر داروی اکسفارم یا ریواستگمین بوده و با توجه به اهمیت خاصی که این دارو دارد باید فقط تحت نظر پزشک تهیه و مصرف شود، بنابراین تمام موارد اعلام شده جایگزین دستورات دکتر معالج نخواهد بود.

Kishmedipharma