

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص اکسوست

قرص اکسوست یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که مواد فعال و موثره آن استامینوفن و اکسی کدون هستند. این محصول دارویی یک ضد درد و مسکن قوی محسوب می‌شود که با ۳۲۵ میلی‌گرم استامینوفن و ۵ میلی‌گرم اکسی کدون همچنین با دوزهای ۳۲۵ میلی‌گرم استامینوفن و ۱۰ میلی‌گرم اکسی کدون فرموله شده در خطوط تولید جامدات در بسته‌های ۲۴ عددی عرضه می‌شود.

موارد مصرف قرص اکسوست (اکسی کدون و استامینوفن)

قرص اکسوست یک داروی ترکیبی برای تسکین دردهای متوسط تا شدید به شمار می‌رود. اکسی کدون یک مسکن اپیوئیدی بوده که متعلق به گروهی از داروها به نام مسکن‌های مخدر است. استامینوفن با مکانیسم عملی که دارد سبب کاهش درد و التهاب در بیمار می‌شود.

به علت وجود اکسی کدون در فرمولاسیون قرص اکسوست این دارو فقط به تجویز و صلاحدید پزشک متخصص قابل تهیه است. موارد مصرف قرص اکسوست را در ادامه به طور خلاصه بیان کرده‌ایم:

- کاهش دردهای حاد (دردهای ناشی از صدمات یا بیماری‌های دیگری مانند سنگ کلیه)
- تسکین دردهای شدید (دردهای پس از عمل جراحی و یا آسیب‌های شدید)
- بهبود دردهای شدید ناشی از بیماری‌های التهابی (آرتریت)
- بهبود دردهای به وجود آمده به علت سوختگی‌های حاد
- تسکین دردهای ناشی از جراحی‌های لثه و دندان
- بهبود دردهای مزمن (سرطان)
- کاهش درد دیسک کمر

موارد احتیاط و یا منع مصرف قرص اکسوست (اکسی کدون و استامینوفن)

منع مصرف یعنی شرایط یا وضعیت‌هایی که در آن‌ها نباید دارو یا درمان خاصی استفاده شود، زیرا ممکن است باعث ایجاد خطرات جدی یا عوارض ناخواسته و جبران‌ناپذیر برای فرد بیمار گردد. استفاده از ترکیبات استامینوفن و اکسی کدون باید با نظارت دقیق پزشک انجام شود تا از بروز عوارض جانبی و خطرات جلوگیری شود. در ادامه برخی از موارد احتیاط و یا منع مصرف قرص اکسوست را بیان خواهیم کرد:

- حساسیت به مواد تشکیل دهنده قرص اکسوست (استامینوفن یا اکسی کدون)
- ابتلا و یا سابقه داشتن بیماری‌هایی چون آسم شدید یا مشکلات تنفسی
- در دوران بارداری، به‌ویژه سه‌ماهه سوم
- مشکلات تیروئید، پانکراس یا کیسه صفرا
- اعتیاد به مواد مخدر یا الکل (الکلیسم)
- داشتن حساسیت به سایر مخدرها
- اختلال در عملکرد کبد یا کلیوی
- آسیب در ناحیه سر یا تشنج
- انسداد معده و یا روده
- مشکلات دفع ادرار
- سندرم آپنه خواب
- خانم‌های شیرده

برخی تداخلات دارویی قرص اکسوست (اکسی کدون و استامینوفن)

همان‌طور که می‌دانید مصرف هم‌زمان برخی داروها، مواد غذایی، مکمل‌های دارویی و گیاهی می‌تواند سبب بروز مشکلات ناخواسته شود. یکی از مهم‌ترین علت‌های ایجاد این مشکلات تداخلات دارویی هستند. به یاد داشته باشید پیش از مراجعه به پزشک معالج حتما لیست کاملی از رژیم غذایی و داروهای مصرفی تهیه نمایید و پزشک خود را در جریان این موارد قرار دهید.

استامینوفن با وجود اینکه یک داروی امن محسوب می‌شود اما در صورت بیش از اندازه می‌تواند مسمومیت استامینوفن و یا مشکلات حاد کبدی را به همراه داشته باشد، بنابراین از استفاده هم‌زمان چند داروی حاوی استامینوفن جدا خودداری نمایید. در ادامه به ذکر برخی از تداخلات دارویی قرص اکسوست (استامینوفن و اکسی کدون) خواهیم پرداخت:

- داروهای موثر بر سطح سروتونین در بدن (داروهای درمان افسردگی، بیماری پارکینسون)
- داروهای سرماخوردگی و یا آلرژی، داروهای گشادکننده برونش برای آسم و COPD
- داروهای بیماری حرکت، سندرم روده تحریک پذیر یا مثانه بیش فعال
- سایر داروهای ضد درد اپیوئیدی یا داروهای ضد سرفه
- داروهای خواب‌آور (قرص خواب و آنتی‌هیستامین‌ها)
- آرام بخش‌ها مانند دیازپام، آلپرازولام، لورازپام

- داروهای درمان اختلالات خلقی
- شل کننده عضلانی
- دیورتیک‌ها

عوارض جانبی قرص اکسوست (اکسی کدون و استامینوفن)

تداخلات دارویی، داشتن بیماری‌های زمینه‌ای، عدم توجه به میزان دوز توصیه شده، مصرف همزمان قرص اکسوست و الکل، سن بیمار، عوامل ژنتیکی و مقاومت‌های دارویی از جمله رایج‌ترین عللی هستند که سبب بروز عوارض جانبی می‌شوند. این مشکلات ناخواسته خفیف، متوسط تا شدید هستند. در صورت ایجاد هرکدام از این مشکلات به صورت حاد و یا مزمن فوراً به اورژانس و یا پزشک متخصص مراجعه نمایید. در ادامه به ذکر برخی از عوارض جانبی قرص اکسوست (استامینوفن و اکسی کدون) خواهیم پرداخت:

- بروز مشکلات گوارشی از جمله یبوست، حالت تهوع، استفراغ و یا درد معده
- سرگیجه، خواب آلودگی، احساس خستگی و ضعف
- احساس شادی یا غم زیاد و شدید
- تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو
- بثورات و راش پوستی، کهیر
- دشواری در تنفس
- سردرد
- تاری دید
- خشکی دهان
- مشکلات کبدی
- وابستگی و یا اعتیاد
- احساس سبکی در سر
- خونریزی یا کبودی غیر معمول
- درد شکمی، بی‌میلی و یا بی‌اشتهایی
- مشکلات ادراری و تیرگی در رنگ ادرار
- بروز مشکلاتی همچون خارش، قرمزی چشم‌ها و یا گر گرفتگی در فرد مصرف‌کننده

نتیجه‌گیری

قرص اکسوست (استامینوفن و اکسی کدون) یکی از مسکن‌های ضد درد محسوب می‌شود که به علت وجود اکسی کدون جزو مخدرها محسوب می‌شود و خطر وابستگی را به همراه دارد. بنابراین این محصول دارویی

فقط به تجویز پزشک قابل تهیه بوده و به هیچ عنوان نباید از میزان دوز مصرفی تجاوز کند.

به علت خاصیت مسکنی قوی که قرص اکسوست دارد به منظور کاهش دردهای حاد و مزمن همچون دردهای پس از جراحی‌ها، آسیب‌های جدید، بیماری‌هایی همچون سرطان و سنگ کلیه تجویز می‌شود.

به یاد داشته باشید تمام اطلاعات ارائه‌شده در خصوص قرص اکسوست، که حاوی استامینوفن و اکسی‌کدون است، صرفاً با هدف افزایش دانش عمومی و آگاهی شما از این محصول تهیه شده‌اند. این توضیحات به هیچ عنوان جایگزین راهنمایی‌ها و توصیه‌های تخصصی پزشک معالج یا داروساز شما نیستند.

توجه داشته باشید که مصرف هر دارو، از جمله قرص اکسوست، نیاز به ارزیابی دقیق وضعیت فردی شما توسط پزشک دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد درمان باید تحت نظر متخصص صورت گیرد. برای جلوگیری از عوارض ناخواسته یا مشکلات مرتبط با مصرف دارو، ضروری است که همیشه پیش از مصرف با پزشک خود مشورت کنید و دستورات وی را دنبال نمایید.