

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص بی پریدن چیست؟

امروزه پارکینسون یکی از دغدغه‌های افراد مسن شده که می‌تواند علاوه بر سلب اعتماد به نفس آن‌ها، فرصت زندگی کردن راحت و بودن در اجتماع را از این افراد می‌گیرد. علت بروز پارکینسون افزایش میزان استیل کولین که یک ترانسمیتر در مغز بوده نسبت به دوپامین است.

بعد از رصد و پایش شرایط سلامتی فرد توسط پزشک متخصص، داروی بی پریدن تجویز می‌شود. این محصول دارویی در شرکت کیش مدیفارم در بسته‌های ۱۰۰ عددی و با دوز ۲ میلی‌گرم و ۴ میلی‌گرم تولید می‌شود.

موارد مصرف داروی بی پریدن

داروی بی پریدن یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع دارو در دسته‌ی آنتی‌کولینرژیک به شمار می‌رود. سازمان غذا و دارو موارد مصرف داروی بی پریدن را کاهش علائم پارکینسون (لرزش، کندی و سفتی عضلات) و بهبود اختلالات ناشی از عوارض خارج هرمی (علائم مانند لرزش و کندی حرکت به علت استفاده از داروهای ضد روان‌پریشی، حرکات غیرارادی (آتتوز) مادرزادی و دژنراسیون هیپاتو لنتیکولار اعلام کرده است.

کمک به ترک سیگار، بهبود علائم [افسردگی](#) و اضطراب، بهبود علائم بیش‌فعالی در بزرگسالان و عدم تمرکز ADHD از دیگر موارد مصرف قرص بی پریدن به حساب می‌آید.

موارد منع مصرف داروی بی پریدن

اگرچه داروی بی پریدن یکی از بهترین پیشنهادات برای درمان و بهبود علائم پارکینسون محسوب می‌شود اما به تمام افراد توصیه نمی‌شود. ممکن است شرایط شما با فرد دیگری متفاوت باشد، شدت و میزان بیماری، سن، ژنتیک، داروهای مصرفی، ژنتیک و نوع بیماری می‌تواند در تجویز پزشک معالج تاثیرگذار باشد.

در مواردی که دارویی برای شما مناسب نیست، دکتر حتماً پیشنهاد دیگری جایگزین می‌کند، پس تا جای ممکن اطلاعات خود را کامل در اختیار ایشان قرار دهید. در ادامه برخی از شایع‌ترین موارد منع مصرف داروی بی پریدن را به طور خلاصه بیان خواهیم کرد:

- حساسیت به بی پریدن و تمام مواد تشکیل دهنده آن، سابقه حساسیت به داروهای درمان کننده اختلالات حرکتی
- صرع (داشتن سابقه تشنج)
- اختلال بایپولار (دوقطبی)

- انسداد روده
- گلوکوم با زاویه بسته (فشار چشمی)
- مشکلات دستگاه ادراری و مثانه (احتباس ادرار)
- افراد دارای بیماری‌های گوارشی
- بارداری و شیردهی
- مصرف به طور هم‌زمان از بازدارنده‌های MAO
- آریتمی قلبی و ناپایداری سیستم قلبی_عروقی (بیماری‌های قلبی_عروقی)
- نقص عملکرد کبدی
- افزایش فشار خون
- میاستنی گراویس
- هایپرتروفی پروستات متوسط تا شدید (بزرگی پروستات)
- استفاده هم‌زمان از داروهای تریپتان

تداخلات دارویی بی پریدن

یکی از مهم‌ترین مواردی که پزشک در زمان تجویز دارو به بیمار آن را بررسی خواهد کرد، استفاده داروهای فعلی مراجع بوده، بنابراین، لازم است فرد در هنگام مراجعه به دکتر لیست تمام داروها و رژیم غذایی که در حال استفاده آن‌ها هست را اعلام کند.

تداخل متابولیسمی، تداخل در دفع و جذب دارو از رایج‌ترین مشکلاتی به شمار می‌رود که در صورت عدم توجه به تداخلات دارویی رخ می‌دهد. از تداخلات دارویی بی پریدن با برخی از دسته‌های داروهای زیر می‌توان به موارد پایین اشاره کرد:

- داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (آمی تریپتیلین)
- مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIs)
- داروهای اوپیوئیدی (مورفین)
- دیگوکسین
- کوئتیاپین
- کینیدین
- آنتی‌هیستامین‌ها
- داروهای ضد تشنج (فنی توئین)
- آمانتادین
- الکل و مشتقات آن
- هالوپریدول و فنوتیازین‌ها

- داروهای ضد فشار خون
- داروهای ضد دیابت
- ضد احتقان‌ها (سودوافدرین)
- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
- گریپ فروت و آب آن
- داروهای ضد پارکینسون (لوودوپا)
- نوشیدنی‌های اسیدی
- داروهای بی‌هوشی
- مکمل‌های غذایی و گیاهی
- داروهای آنتی‌هیپرتانسیو (مانند متوپرولول)

عوارض جانبی داروی بی‌پریدن

داروی **بی‌پریدن** اگرچه مزایای بسیاری دارد و می‌تواند بسیار مفید و کمک کننده باشد اما می‌تواند عوارض جانبی نیز به همراه داشته باشد. در ادامه به رایج‌ترین عوارض جانبی داروی بی‌پریدن خواهیم پرداخت:

- افزایش فشار داخل چشم
- سرگیجه، سر در گمی و هذیان
- اختلالات شناختی و ذهنی خصوصا در افراد مسن (عدم تمرکز و اختلال در حافظه کوتاه مدت)
- واکنش‌های حساسیتی (جوش پوست)
- مشکل در دید و احساس تاری در بینایی
- کاهش تعریق
- احتباس ادرار خصوصا در افراد سالمند
- خواب‌آلودگی
- تنگی نفس و مشکلات تنفسی
- خشکی دهان، بینی و گلو
- هیجان‌زدگی بیش از حد و تحریک‌پذیری
- افزایش حساسیت چشم‌ها به نور
- حالت تهوع و استفراغ

نکات مهم درباره داروی بی‌پریدن

با توجه به اینکه داروی بی‌پریدن یکی از داروهای دسته ضد کولینرژیک به شمار می‌رود، سوالات زیادی درباره این محصول وجود دارد. برای کاهش

ابهام در زمان مصرف داروها بهتر است تمام محصولات دارویی را تا پایان دوره در بسته‌های خود همراه با بروشور نگهداری بفرمایید.

راهنمایی گرفتن از دکتر داروساز یکی دیگر از راه‌هایی به شمار می‌رود که ابهامات بیمار را در خصوص استفاده از قرص بی‌پریدن برطرف می‌نماید. ما در ادامه سعی کرده‌ایم به نکات مهمی در خصوص مصرف این محصول حساس بپردازیم:

- یکی از رایج‌ترین سوالاتی که همیشه با آن مواجه هستیم این بوده که **آیا قرص بی‌پریدن و لاغری با هم در ارتباط هستند؟**

همان‌طور که گفته شد قرص بی‌پریدن به منظور درمان و بهبود برخی علائم مربوط به پارکینسون تجویز می‌شود. این محصول دارویی بر میزان استیل کولین که یک انتقال‌دهنده در مغز است تاثیر می‌گذارد. استیل کولین در بدن تأثیرات بسیاری دارد از جمله:

هضم غذا، متابولیسم و تنظیم اشتها. قرص بی‌پریدن می‌تواند سبب بی‌اشتهایی شود بنابراین برخی از افراد تصور می‌کنند بی‌پریدن و لاغری با هم ارتباط مستقیمی دارند و می‌توان از این دارو به منظور کاهش وزن استفاده کرد.

تغییرات در استیل کولین منجر به کاهش وزن و کاهش اشتها، یبوست (عدم جذب مواد مغذی و نهایتاً لاغری فرد) و خشکی دهان (کاهش میل به غذا و نوشیدنی و تاثیر غیر مستقیم بر وزن) می‌شود.

حتماً به یاد داشته باشید قرص بی‌پریدن و لاغری ارتباط مستقیم ندارند و به هیچ عنوان این دارو برای لاغری تجویز نخواهد شد. بهترین راه برای کاهش وزن، ورزش و تغذیه مناسب بوده و بهتر است از داروها به منظور لاغری خصوصاً به صورت خودسرانه استفاده نفرمایید چراکه می‌تواند سبب بروز عوارض ناخواسته‌ای شود.

- قرص بی‌پریدن باید در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از نور خورشید در جای خشک و خنک نگهداری شود. از یخ‌زدگی و قرار گرفتن دارو در دمای زیاد جداً خودداری بفرمایید.

- این محصول شامل ۱۰۰ عدد قرص بی‌پریدن با دوز ۲ میلی‌گرمی و ۴ میلی‌گرمی بوده که به تشخیص پزشک دوز آن معین می‌شود و باید برای نتیجه بهتر تا پایان دوره درمان، آن را مصرف نمایید. به علت فعالیت تجمعی معمولاً قرص بی‌پریدن با دوز پایین شروع شده و پس از چند روز تا چند هفته دوز آن افزایش می‌یابد.

- از توصیه داروی بی پریدن به دیگران اجتناب کنید چرا که این دارو برای شرایط فعلی شما تجویز شده و شاید برای شخص دیگری مناسب نباشد.
- حتما در هنگام خرید تاریخ انقضای تمام محصولات دارویی از جمله قرص بی پریدن را بررسی بفرمایید. هر چند وقت یکبار کمد داروهای خود را مرتب کنید و داروهای منقضی شده را به طور صحیح که فردی دیگری امکان استفاده نداشته باشد، امحا بفرمایید.
- تمام محصولات دارویی بهتر است دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در صورت فراموش کردن مصرف داروی بی پریدن، به محض یادآوری آن را استفاده کنید. مگر اینکه ۲ ساعت و یا کمتر به موعد دوز بعدی مانده باشد. در زمان مصرف به هیچ عنوان قرص بی پریدن را تقسیم، خرد و یا دو برابر نفرمایید.
- استفاده همزمان از قرص بی پریدن و الکل میتواند خطراتی را از جمله تضعیف سیستم عصبی مرکزی (اختلال در تعادل و کاهش هوشیاری) به همراه داشته باشد. در صورت مصرف بی پریدن، از مصرف الکل حداقل تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف دارو خودداری کنید. در صورتی که وابستگی شدید به مصرف الکل دارید حتما در زمان مراجعه به پزشک این مورد را اعلام بفرمایید.
- از آنجایی که از عوارض مصرف داروی بی پریدن خواب‌آلودگی است، در دوره درمان تا حد امکان از کارهای پر خطر که نیاز به تمرکز دارند از جمله رانندگی و کار با ماشین‌آلات اجتناب بفرمایید.
- نوشیدن آب و مایعات کافی در دوره استفاده از بی پریدن میتواند از بروز یبوست و خشکی دهان تا حد ممکن جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری

قرص بی پریدن یکی از انواع داروهای شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که در دوزهای ۲ و ۴ میلی‌گرم در بسته‌های ۱۰۰ عددی تولید می‌شود. اگرچه خرید و تهیه این دارو در داروخانه‌های سراسر کشور قابل انجام بوده اما به هیچ عنوان بدون نسخه پزشک نباید تهیه شود.

داروی بی پریدن به منظور کاهش علائم پارکینسون و عوارض ناخواسته خارج هرمی توسط دکتر معالج در دوز و مدت زمان مشخصی توصیه می‌شود. بهتر است به منظور دریافت بهترین نتیجه تمام طول درمان را فرد طی کند.

قرص بی پریدن و لاغری ارتباط غیر مستقیمی دارند، یعنی این محصول دارویی سبب کاهش اشتها و نهایتاً کاهش وزن و لاغری می‌شود اما به طور خاص برای این منظور تجویز نمی‌شود.

لازم است به یاد داشته باشید تمام اطلاعات اعلام شده برای افزایش آگاهی شما از نحوه مصرف و نکات حائز اهمیت قرص بی پریدن بوده و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشکی نخواهد بود.

Kishmedipharma

Kishmedipharma