



گروه دارویی کیش مدیفارم



قرص تادالافیل کیش مدیفارم

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که قرص تادالافیل برای چیست؟ حتما تا آخر با ما همراه باشید. قرص تادالافیل یک داروی تجویزی بوده که به منظور درمان اختلالات نعوظ تولید و عرضه می‌شود. یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم، قرص تادالافیل در دوزهای متفاوت است.

مکانسیم اثر قرص تادالافیل به این صورت است که مهار اختصاصی آنزیم فسفودی استراز نوع ۵ و به دنبال آن افزایش cGMP در عضلات صاف و بهبود نعوظ در نتیجه افزایش جریان خون را به همراه دارد. به نوعی می‌توان از این محصول با عنوان قرص تاخیری تادالافیل نیز نام برد.

این محصول دارویی از دسته‌بندی داروهای جنسی و یا قلبی عروقی به شمار می‌آید و به شکل قرص در بلیسترهای ۴ عددی تادالافیل ۲۰ و ۱۰ در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید و ارائه می‌شود. در صورت تجویز پزشک متخصص می‌توانید آن را از داروخانه‌های سراسر کشور به قیمت مناسب و مقرون به صرفه تهیه بفرمایید. در ادامه به بررسی نکات مهمی از جمله موارد مصرف، زمان مصرف قرص تادالافیل و عوارض آن خواهیم پرداخت.

موارد مصرف قرص تادالافیل ۲۰ و ۱۰

از قرص تادالافیل ۲۰ و ۱۰ در صورت تجویز پزشک متخصص معمولاً برای درمان و بهبود ۳ مورد استفاده می‌شود، در ادامه به ذکر این موارد خواهیم پرداخت:

- هیپرپلازی خوش خیم (PBH) کمک به شل شدن عضلات پروستات و مثانه
- اختلال نعوظ (ED) با افزایش جریان خون در آلت تناسلی
- فشار خون شریانی ریوی (PAH) شل کردن رگ‌های خونی در ریه

در صورتی که مشکلات قلبی دارید و یا پزشک شما فعالیت‌های نظیر رابطه جنسی را ممنوع کرده، از قرص تادالافیل استفاده نفرمایید. همچنین اگر نعوظ آلت تناسلی بیش از ۴ ساعت زمان برد، فوراً به اورژانس و پزشک متخصص مراجعه بفرمایید.

عوارض قرص تادالافیل

اگرچه قرص تادالافیل به درمان برخی از اختلالات کمک می‌کند و می‌تواند سبب افزایش اعتماد به نفس در افراد خصوصاً با مشکلات در نعوظ شود، اما برخی اوقات ممکن است تداخلات دارویی و یا عوارض ناخواسته را به همراه داشته باشد.

به یاد داشته باشید حتما زمان خرید هر محصول دارویی بهتر است اطلاعات داخل بروشور و جعبه را به طور کامل مطالعه بفرمایید و در صورت داشتن ابهام، قبل از مصرف دارو با دکتر داروساز مشورت کنید. از بارزترین عوارض قرص تادالافیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بروز درد در ناحیه بازو، پا، کمر و دیگر عضلات بدن
- سوزش در معده و ایجاد مشکلات گوارشی
- عفونت مجاری تنفسی و نازوفارنژیت
- التهاب و قرمزی در پوست صورت
- بروز مشکل در تنفس و بلعیدن
- ایجاد اختلال در عملکرد کبد
- حالت تهوع و استفراغ
- سر گیجه و سر درد
- احساس گر گرفتگی
- حساس شدن به نور
- افت فشار خون
- بی میلی شدید
- آبریزش بینی
- خون دماغ
- آریتمی
- اسهال
- کهیر

همچنین در صورتی عوارض قرص تادالافیل را به صورت کاهش بینایی، شنوایی و گزگز گوش حاد تجربه کردید، فوراً به اورژانس و پزشک متخصص مراجعه بفرمایید.

زمان مصرف قرص تادالافیل

اینکه چطور و در چه زمان مصرف قرص تادالافیل انجام شود، بستگی به توصیه پزشک شما دارد. معمولاً استفاده از این محصول به صورت روزانه و یا نوبتی توصیه می‌شود. به این صورت که یا روزانه ۱ عدد قرص میل شود و یا اینکه ۳۰ دقیقه قبل از رابطه جنسی قرص تادالافیل را مصرف می‌کنند. به منظور درمان اختلالات نعوظ دوز مصرفی قرص تادالافیل از ۱۰ شروع شده و در صورت تشخیص پزشک به دوز ۲۰ افزایش و یا به دوز ۵ کاهش می‌یابد.

همچنین زمان مصرف قرص تادالافیل در افراد با مشکل پروستات معمولا به صورت روزانه، بلافاصله بعد از بیدار شدن در یک زمان مشخص صورت می‌گیرد. این محصول دارویی می‌تواند همراه با غذا و یا بدون آن میل شود، فقط لازم به ذکر است در صورتی که زمان مصرف قرص تادالافیل با خوردن یک وعده غذایی همراه باشد، می‌تواند زمان اثرگذاری را به تعویق بیندازد. مصرف قرص تادالافیل به افراد بین ۱۸ الی ۶۰ سال در صورت توصیه پزشک متخصص تجویز می‌شود.

اثر قرص تادالافیل چند ساعت است؟

قرص تادالافیل کیش مدیفارم با افزایش فشار خون در ناحیه تناسلی آقایان سبب ایجاد نعوظ می‌شود، در صورتی که این محصول دارویی ۳۰ دقیقه پیش از شروع فعالیت جنسی میل شود، ممکن است تا ۳۶ ساعت ماندگاری داشته باشد. بنابراین لزوما نیاز نیست قرص تادالافیل را دقیقا نیم ساعت قبل از شروع رابطه استفاده کنید. در واقع اینکه بگوییم اثر قرص تادالافیل چند ساعت است، بستگی به دوز مصرفی، مصرف همزمان با غذای سنگین و یا سبک، و شرایط جسمانی شما دارد. از دیگر مواردی که اثر قرص تادالافیل را کاهش یا افزایش می‌دهد می‌توان موارد زیر را نام برد:

- سن
- دیابت
- بیماری قلبی
- مشکلات کبدی
- مشکلات کلیوی
- داشتن فشار خون پایین
- استرس و اضطراب فرد
- عوامل وراثتی و ژنتیکی
- مشکلات و اختلالات روانی
- کیفیت خواب و سطح خستگی فرد
- استفاده از سیگار و سایر موارد مخدر
- نوشیدن الکل، کافئین زیاد و یا استفاده از میوه‌هایی مانند گریپ فروت
- مصرف همزمان داروهای دیگر (برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها، برخی از ضد قارچ‌ها مانند کلوتازول)

نکات مهم در مورد مصرف قرص تادالافیل

ما با تحقیقاتی که داشته‌ایم، متوجه رایج‌ترین سوالات شما از پزشک متخصص و دکتر داروساز شده‌ایم. پاسخ برخی از پرسش‌ها در خصوص داروها همیشه

در دفترچه‌های راهنما وجود دارد، بنابراین با مطالعه دقیق نکات ذکر شده در دفترچه‌های راهنما دارو می‌توانید بسیاری از جواب‌های خود را بگیرید. اما ما در اینجا برخی موارد دیگر را به طور خلاصه در زیر توضیح خواهیم داد:

- نگهداری قرص تادالافیل باید به این صورت باشد که دور از دسترس کودکان، در جای خشک و خنک گذاشته شود. از یخ زدگی و گرمای بیش از حد به قرص تادالافیل جدا خودداری بفرمایید.
- قرص تادالافیل به هیچ عنوان سبب جلوگیری از انتقال بیماری‌های مقاربتی نمی‌شود و نیاز است در زمان برقراری رابطه جنسی تمام نکات بهداشتی و پیشگیری را رعایت بفرمایید.
- صرفا خوردن یک قرص تادالافیل نمی‌تواند به طور کامل اختلالات نعوظ را از بین ببرد و حتما باید فرد تحریک جنسی را نیز تجربه کند.
- از عوارض قرص تادالافیل در زمان مصرف با الکل می‌توان سر درد و سرگیجه را ذکر کرد. به یاد داشته باشیم بسیاری از داروها اگر به طور همزمان با الکل مصرف شوند، مشکلات ناخواسته‌ای را به وجود می‌آورند.
- زمان مصرف قرص تادالافیل با توجه به اثر گذاری طولانی مدت آن می‌تواند چند ساعت قبل از شروع رابطه جنسی باشد.
- قرص تادالافیل برای افراد با مشکلات قلبی، دارای فشار خون پایین، مشکلات خونی، داشتن سابقه نعوظ طولانی، اختلالات کبدی، مشکلات کلیوی و حساس به ماده تادالافیل توصیه و تجویز نمی‌شود. در صورتی که قبلا از این دارو استفاده کردید و دچار عوارض خاصی شدید حتما پزشک متخصص خود را در جریان این سابقه قرار دهید.
- از مصرف میوه‌هایی از دسته گریپ فروت همزمان با این دارو خودداری بفرمایید، چرا که می‌تواند اثر گذاری دارو را تحت خود تاثیر قرار دهد. مصرف همزمان تادالافیل و گریپ فروت می‌تواند منجر به افزایش غلظت تادالافیل در خون شود که ممکن است باعث افزایش خطر عوارض قرص تادالافیل شود. دلیل این امر تداخل گریپ فروت با آنزیم‌های کبدی است که در متابولیسم داروها نقش دارند.
- قرص تادالافیل با برخی از داروهای فشار خون و نیترات‌ها می‌تواند تداخلات دارویی ایجاد کند.
- مدت زمان ماندگاری اثرات قرص تادالافیل می‌تواند تا چند برابر بیشتر از ویاگرا باشد.
- دوزهای رایج قرص تادالافیل ۵۰، ۲۰، ۱۰، ۵ و ۲/۵ است.
- قرص تادالافیل بیشتر از ۱ مرتبه در روز استفاده نمی‌شود.

از آنجایی که مسئولیت اجتماعی ما بالا بردن آگاهی سطح جامعه است، سعی کردیم به طور کامل توضیح دهید که قرص تادالافیل برای چیست، اما همانطور که بارها اشاره کرده‌ایم، نکات ذکر شده به هیچ عنوان نمی‌توانید بر نظر پزشک معالج شما ارجعیت داشته باشد.

Kishmedipharma