

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص تراموست

قرص تراموست یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که حاوی ترامادول و استامینوفن است. این محصول دارویی فقط به تجویز پزشک متخصص قابل تهیه بوده و امکان خرید این محصول و استفاده آن به صورت خود سرانه وجود ندارد. برای پاسخ دهی بهتر به درمان پیشنهاد می‌شود طبق دستور پزشک طول دوره درمان را بگذرانید و از قطع این دارو بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

ترکیب استامینوفن و ترامادول یک داروی مسکن قوی به شمار می‌رود که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می‌شود. قرص تراموست اغلب برای بیمارانی که نیاز به کنترل درد دارند و نمی‌توانند از داروهای ضد درد معمولی استفاده کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استامینوفن موجود در قرص تراموست یک مسکن و تب‌بر محسوب می‌شود که با کاهش تولید مواد شیمیایی در مغز که باعث درد و تب می‌شوند، عمل می‌کند. استامینوفن به تنهایی برای دردهای خفیف تا متوسط مؤثر است.

یکی دیگر از ماده‌های موثر قرص تراموست ترامادول بوده که یک مسکن اوپیوئیدی بوده که به گیرنده‌های اوپیوئید در مغز متصل شده و به کاهش درک درد کمک می‌کند. همچنین با مهار بازجذب نوراپی‌نفرین و سروتونین، تأثیر ضد درد خود را تقویت می‌کند.

موارد مصرف قرص تراموست (استامینوفن و ترامادول)

به علت مکانیسم عملی که ترکیبات قرص تراموست دارد به منظور کاهش دردهای شدید تجویز می‌شود. معمولاً این مسکن درد به افرادی توصیه شده که با دیگر مسکن‌های درد تسکین نمی‌یابند. برخی از موارد مصرف قرص تراموست را در ادامه نام خواهیم برد:

- دردهای پس از جراحی
- دردهای مزمن و شدید
- دردهای ناشی از سرطان
- آرتروز و دردهای استخوانی
- دردها ناشی از آسیب‌های نخاعی
- تسکین دردهای ناشی از سنگ کلیه یا سنگ کیسه صفرا
- بهبود و کاهش دردهای ناشی از ترک مواد مخدر و یا سایر اویپوئیدها

موارد احتیاط و یا منع مصرف قرص تراموست

همان‌طور که می‌دانید داروها اگرچه به منظور درمان تولید می‌شوند اما پزشک متخصص آن‌ها را در صورت صلاحدید به بیمار توصیه می‌کند و احتمال دارد داروهایی که برای شما تجویز می‌شود اصلاً مناسب برای شخص دیگری نباشد چرا که شرایط و وضعیت‌ها متفاوت هستند.

قرص تراموست از آن دسته داروهایی به شمار می‌رود که به هیچ‌عنوان نباید بدون دستور و تجویز پزشک آن را استفاده کرد چرا که علاوه بر مشکلات ناخواسته‌ای که می‌تواند به همراه داشته باشد، احتمال خطر وابستگی و اعتیاد را در بر دارد.

- بارداری و شیردهی
- کودکان زیر ۱۲ سال
- نارسایی کلیوی
- انسداد مجاری گوارشی
- خطر بروز افکار خودکشی
- پایین بودن فشار خون بیمار
- ابتلا به مشکلات قابل توجه تنفسی
- کودکان زیر ۱۸ سال با سابقه جراحی برداشتن لوزه
- سندرم سروتونین (ممکن است تهدید کننده زندگی باشد)
- خطر احتمال تشنج در بیماران مبتلا به صرع، سابقه تشنج
- آسم حاد یا شدید و مصرف در محیطی بدون نظارت یا بدون تجهیزات احیا
- حساسیت قبلی به ترامادول، استامینوفن، هر جزء دیگر این فرآورده یا مواد مخدر
- بیماران با فشار بالای داخل جمجمه، تومورهای مغزی، آسیب سر، یا اختلال هوشیاری

تداخلات دارویی قرص تراموست (استامینوفن و ترامادول)

از جمله اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن مشکلات و عوارض پس از مصرف داروها تداخلات دارویی هستند. برخی داروها در صورتی که به صورت هم‌زمان استفاده شوند نه تنها آثار درمانی ندارند بلکه می‌توانند مشکلات زیان‌بار و جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشند. در ادامه به برخی از تداخلات دارویی قرص تراموست اشاره خواهیم کرد:

- الکل

- داروهای ضد انعقاد
- استروئیدهای جنسی
- بوپرونورفین، نالبوفین
- داروهای ضد قارچ مثل کتوکونازول
- داروهای القاکننده CYP3A4 مثل ریفامپین
- برخی داروهای ضد فشار خون مثل دیلتیازم
- بنزودیازپین‌ها مانند آلپرازولام و دیازپام و لورازپام
- برخی داروهای ضد سرطان مثل تاموکسیفن و ایرینوتکان
- انواع داروهای ضد افسردگی سروتونرژیک مثل سرتالرین
- ضد تشنج‌ها از جمله باربیتورات‌ها، کاربامازپین و فنی توئین
- داروهای مهارکننده CYP2D6 مثل فلوکستین، پاروکستین، بوپروپیون
- مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIs) مثل سلژیلین، ترانیل
- سیپرومین، فنلزین، لینه زولید
- داروهای مهارکننده CYP3A4 مانند برخی آنتی بیوتیک ها مثل کلاریترومایسین، اریترومایسین و ایزونیازید

عوارض جانبی قرص تراموست

همان‌طور که توضیح دادیم داروها برای تمام افراد مناسب نیستند و پزشک متخصص با بررسی دقیق می‌تواند بهترین راه‌کاری درمانی را ارائه کند. اگر شخصی به دارویی حساسیت داشته باشد یا داروهای دیگری مصرف کند که سبب بروز تداخلات دارویی شود، پزشک قطعاً جایگزین‌های درمانی را تجویز می‌کند.

برخی مشکلات پس از استفاده داروها احتمال دارد بعد از مدتی از بین بروند اما اگر مشکلات تشدید و مزمن شدند حتماً باید فوراً به پزشک و اورژانس مراجعه نمایید. عوارض جانبی داروها به دو دسته شایع و نادر تقسیم می‌شوند. قرص تراموست نیز می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

همچنین باید گفت عدم توجه به میزان دوز توصیه شده و طول درمان مصرف یکی از اصلی‌ترین علت‌ها بروز مشکلات ناخواسته است. از جمله عوارض جانبی قرص تراموست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تشنج
- سر درد
- راش پوستی
- افت فشار خون

- لرزش و خستگی
- اسهال و یبوست
- اضطراب و بی قرار
- سندروم سروتونین
- گیجی و خواب آلودگی
- نارسایی کبدی و کلیوی
- ریسک بروز افکار خودکشی
- واکنش‌های آلرژیک و ازدیاد حساسیت
- سرکوب سیستم تنفسی جدی و تهدیدکننده حیات یا کشنده
- خطر وابستگی، اعتیاد و سوء استفاده (ممکن است منجر به مرگ شود)
- مصرف تصادفی قرص ترامادول هیدروکلراید و استامینوفن، به ویژه توسط کودکان، می‌تواند منجر به اووردوز شود و کشنده باشد.

نتیجه‌گیری

قرص تراموست (استامینوفن و ترامادول) یکی از محصولات تولید شده در شرکت داروسازی کیش مدیفارم است. این محصول دارویی یک مسکن قوی محسوب شده که فقط با تجویز پزشک به منظور کاهش دردهای شدید توصیه می‌شود.

برای کاهش دردهایی که با دیگر مسکن‌های درد پاسخ مناسبی نگرفتند معمولاً در صورت صلاحدید پزشک متخصص قرص تراموست پیشنهاد می‌گردد. بهتر است برای دستیابی به بهترین نتیجه کاملاً طبق نظرات و دستورات دکتر معالج قرص تراموست را مصرف نمایید.

لازم به یادآوری است که این محتوا به هیچ عنوان جایگزین توصیه‌های پزشکی نخواهد شد، و مشاوره با پزشک برای مصرف هر دارویی از جمله قرص تراموست ضروری است.