

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص بوپرنورفین

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که بوپرنورفین چیست؟ موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و عوارض آن کدامند؟ تا پایان این مطلب با ما همراه باشید. قرص زیر زبانی بوپرنورفین یک اپیوئید نیمه مصنوعی مشتق شده از تبائین به شمار می‌آید، این محصول دارویی آگونیست نسبی گیرنده μ آنتاگونیست گیرنده K است.

قرص زیر زبانی بوپرنورفین Buprenorphine در شرکت داروسازی کیش مدیفارم در بسته‌های ۱۰۰ عددی و دوزهای ۲ mg، ۴/۰ mg و ۸ mg تولید می‌شود. این محصول با تجویز پزشک متخصص در داروخانه‌ها قابل خریداری است. با توجه به ژنریک بودن قرص بوپرنورفین، قیمت ارزان و مقرون به صرفه‌ای دارد.

قرص بوپرنورفین به صورت زیر زبانی و قرص‌های روتین در سراسر دنیا تولید می‌شوند. قرص زیر زبانی بوپرنورفین باید به صورت کامل زیر زبان قرار گیرد تا جذب بهتری داشته باشد.

عوارض قرص بوپرنورفین

تمام محصولات دارویی به منظور درمان بیماری‌ها و مشکلات جسمانی و روانی تولید شده‌اند، اما باید توجه داشت ممکن است برای تمام افراد مناسب نباشند. عوارض داروی بوپرنورفین می‌تواند ناشی از تداخلات دارویی رخ دهد. از دیگر عواملی که می‌تواند سبب این مشکلات ناخواسته شوند، این موارد هستند: سن، جنسیت، شرایط سلامت جسمانی، مصرف بیش از اندازه و یا کم‌تر از توصیه پزشک، سابقه پزشکی، مصرف دخانیات و الکل. در ادامه عوارض قرص بوپرنورفین را نام برده‌ایم:

- خارش
- احتباس ادرار
- مشکل در بینایی
- سرگیجه و سر درد
- استرس و اضطراب
- بروز حالت تهوع و استفراغ
- افت شدید میزان فشار خون
- خستگی و کسلی بیش از اندازه
- احساس خوشحالی و سرخوشی مفرط

- افزایش فشار داخل جمجمه ای و دپرسیون تنفس (حتما جدی گرفته شود)

قرص بوپرنورفین برای زود انزالی

همان‌طور که گفته شد قرص زیر زبانی بوپرنورفین یک داروی موثر برای ترک اعتیاد در نظر گرفته می‌شود. تعدادی از افراد این محصول دارویی را به عنوان یک راه‌حل برای تاخیر در انزال استفاده می‌کنند. اگرچه در تحقیقات نشان داده شده که برخی از داروهای ایپیوئیدی در زمان انزال تاثیر دارند، اما هنوز به طور کامل نشانه‌های مبنی بر قرص بوپرنورفین برای زود انزالی و تاثیرات مثبت آن وجود ندارد.

از آنجایی که مصرف قرص بوپرنورفین در میزان سطح انتقال‌دهنده‌های عصبی در مغز (سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین) تاثیرگذار است، احتمال دارد به صورت غیر مستقیم بر تاخیر در انزال موثر باشد. به طور کل می‌توان گفت قرص بوپرنورفین برای زود انزالی نیست، اگرچه ممکن است در برخی افراد منجر به داشتن زمان بیشتری برای برقراری ارتباط جنسی باشد.

همچنین از نظر متخصصین قرص زیر زبانی بوپرنورفین یک محصول تاخیری به شمار نمی‌آید. اگر کاهش میل جنسی و یا زود انزالی دارید، می‌توانید با مراجعه به یک متخصص جایگزین‌های دیگری را مصرف بفرمایید.

موارد مصرف و فواید قرص بوپرنورفین

فواید قرص بوپرنورفین و موارد مصرف آن باعث شده به عنوان یکی از اولین انتخاب‌ها نزد متخصصین باشد. از فواید قرص بوپرنورفین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش علائم ناشی از ترک مواد مخدر
- تسکین‌دهنده بسیار قوی برای دردهای مزمن
- پیشگیری از مصرف مجدد مواد در افراد با سابقه سوء مصرف
- درمان اعتیاد به مواد مخدر جهت سم زدایی و نیز به عنوان درمان نگهدارنده
- کمک به ترک اعتیاد مواد افیونی و مخدری همچون مورفین، کدئین و هروئین

موارد منع مصرف قرص بوپرنورفین

مصرف قرص زیر زبانی بوپرنورفین اگرچه دارای مزایای بسیاری است، اما برای همه افراد مفید نیست و می‌تواند سبب بروز تداخلات دارویی و به دنبال

آن عوارض ناخواسته و مشکلات جبران ناپذیری شود. از دیگر موارد منع مصرف قرص بوپرنورفین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- داشتن حساسیت به قرص بوپرنورفین و هرگونه مواد غیر فعال در این محصول
- افراد مسن و سالمند خصوصا بالای ۶۵ سال سن
- نارسایی شدید و حاد کلیوی، ریوی و کبدی
- بی‌نظمی عملکردهای غدد تیروئید
- مبتلا به هیپرپلازی پروستات
- افراد وابسته به نارکوتیک‌ها
- زنان باردار و شیرده
- افراد ناتوان جسمی
- کودکان زیر ۶ سال
- دپرسیون عصبی
- نارسایی آدرنال
- الکسیسم حاد
- انسداد یورتا
- کوما

درمان نگهدارنده با قرص زیر زبانی بوپرنورفین

درمان نگهدارنده با قرص بوپرنورفین شامل ۳ مرحله القا، تثبیت و نگهدارنده است. در ادامه به طور مفصل در مورد هر ۳ مرحله صحبت خواهیم کرد:

- **روز اول درمان:** قبل از شروع القا، در بیماران مصرف‌کننده مخدرهای کوتاه اثر مانند هروئین، تریاک و مورفین‌ها باید حداقل ۴ الی ۲۴ ساعت از زمان آخرین مصرف سپری شده باشد. در مورد متادون این بازه زمانی تغییر کرده و بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت در نظر گرفته می‌شود. پس از ظهور علائم محرومیت خفیف تا متوسط، اولین دوز قرص بوپرنورفین که معمولا بین ۲ الی ۴ میلی‌گرم است به بیمار داده می‌شود و بیمار باید ۲ ساعت تحت نظر باشد. با شروع مجدد علائم محرومیت، دوز دوم به بیمار داده شده و حتما توجه داشته باشید که دوز قرص زیر زبانی بوپرنورفین در روز اول از ۸ میلی‌گرم به هیچ عنوان تجاوز ننماید.
- **روز دوم درمان:** متخصصین پاسخ بیمار به مصرف قرص زیر زبانی بوپرنورفین در روز اول را ارزیابی می‌کنند. اگر نشانه‌های محرومیت از بین رفت، دوز روز اول به عنوان دوز کلی در نظر گرفته می‌شود. در غیر اینصورت علاوه بر دوز روز اول، ۴ میلی‌گرم قرص بوپرنورفین به دوز

دارو اضافه خواهد شد. چنانچه نشانه‌های محرومیت بعد از ۲ ساعت بروز کرد، دوز بعدی دارو که ۲ الی ۳ میلی گرم است به بیمار داده خواهد شد. دوز قرص بوپرنورفین در روز دوم نباید از ۱۶ میلی گرم در روز تجاوز کند.

افزایش دوز جهت القاء درمان در دوزهای بعدی ۸ میلی گرم روزانه و تا سقف حداکثر ۳۲ میلی گرم در روز محسوب می‌شود. در صورتی که با دوزهای روزانه مذکور علائم محرومیت کنترل نشد و از بین نرفت، تسکین علائم با مداخلات دارویی غیر مخدر تحت نظر متخصصین توصیه می‌شود. اگر دوز نهایی قرص زیر زبانی بوپرنورفین در بیمار احساس سرخوشی ایجاد کرد باید ۲ میلی گرم از دور را کم کرد.

- **مرحله القا:** درمان به منظور کمک به بیماری جهت جایگزین نمودن قرص زیر زبانی بوپرنورفین به جای ماده مخدر مورد سو مصرف است.

نتیجه‌گیری

اگر تا به حال دریافته‌اید که قرص بوپرنورفین چیست، می‌دانید که این دارو فقط با تجویز پزشک قابل خریداری است و به هیچ عنوان فرد امکان دریافت این محصول دارویی بدون نسخه را ندارد. قرص زیر زبانی بوپرنورفین در دوزهای ۲ میلی گرم، ۰/۴ میلی گرم و ۸ میلی گرم در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید می‌شود. فواید قرص بوپرنورفین باعث می‌شود این دارو به درمان دردهای مزمن، کاهش علائم ترک اعتیاد و کمک کننده ترک اعتیاد مورفین و کدئین‌ها بپردازد. قرص بوپرنورفین برای زود انزالی در نظر گرفته نمی‌شود.

قرص بوپرنورفین فقط با تجویز در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و قطعاً نکات مهمی در خصوص استفاده از آن وجود دارد. ما در اینجا سعی کرده‌ایم قرص زیر زبانی بوپرنورفین را معرفی کنیم اما تمام این موارد فقط به منظور آگاهی شما، از محصول پیش‌رو بوده و در حین دوره به صورت کامل باید زیر نظر متخصص معالج باشید.