

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص لیپومیس

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که قرص رزواستاتین برای چیست؟ حتما تا پایان این مطلب با ما همراه باشید. قرص لیپومیس، یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم، با نام ژنریک داروی رزواستاتین، در دوزهای ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم تولید می شود. داروی رزواستاتین یک محصول دارویی مهارکننده آنزیم HMG-CoA ردوکتاز (استاتین) به شمار می رود که برای کاهش سطح کلسترول و تری گلیسرید خون استفاده می گردد.

قرص لیپومیس با کاهش تولید کلسترول در کبد و افزایش برداشت کلسترول از خون، به بهبود پروفایل لیپیدی خون کمک می کند و به طور مؤثری در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی مؤثر است. داروی رزواستاتین یکی از محصولات محسوب می گردد که بسیار مورد توجه متخصصین قرار گرفته و در بسیاری از مواقع به منظور درمان و بهبود مشکلات مذکور تجویز می شود.

موارد مصرف داروی رزواستاتین

داروی رزواستاتین با نام تجاری قرص لیپومیس از دسته داروهای قلب و عروق شمرده می شود. این محصول دارویی با مکانیسم عملی که دارد در صورتی که همراه با رژیم غذایی، کاهش وزن و ورزش مصرف شود می تواند ریسک خطرات و سبکتهای قلبی را کاهش دهد. به طور کل می توان گفت موارد مصرف داروی رزواستاتین موارد زیر هستند:

- دیست لیپوپروتئینی مختلط
- هیپرکلسترولمی هموزیگوت خانوادگی (بیماری ارثی)
- افزایش میزان کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا
- پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
- هیپرکلسترولمی اولیه

نکات مهم در زمان مصرف قرص لیپومیس

پیش از مصرف هر دارو حتما از پزشک معالج و یا دکتر داروساز به منظور استفاده صحیح از داروها راهنمایی بگیرید. پیروی از دستورالعمل های موجود در بسته های دارویی بسیار حائز اهمیت است. در ادامه به برخی از نکات ساده اما مهم در طول درمان با قرص لیپومیس خواهیم پرداخت:

- در صورت فراموشی یک دوز از قرص لیپومیس در زمان یادآوری آن را میل بفرمایید البته اگر نزدیک به زمان دوز بعدی هستید این نوبت را رها کنید و در زمان مقرر به طور روتین قبل شروع به استفاده بفرمایید.
- از شکستن، له و خورد کردن قرص لیپومیس خودداری نمایید.
- بعد از تاریخ انقضا داروی رزوواستاتین، آن را به روش صحیح با کمک گرفتن از دکتر داروساز امحا بفرمایید.
- تمام محصولات دارویی باید دور از دسترس کودکان باشند.
- داروی رزوواستاتین را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد در جای خشک و خنک به دور از نور خورشید یا رطوبت نگهداری فرمایید.
- معمولاً قرص لیپومیس در روز یک بار همراه با وعده غذایی یا بدون آن میل می‌شود.
- استفاده از قرص لیپومیس می‌تواند به جنین آسیب جدی برساند، لازم است در این دوران به منظور مصرف هر محصول دارویی با پزشک معالج خود در ارتباط باشید.
- از خوددرمانی به شدت پرهیز کنید و بدون دستور پزشک به طور خودسرانه استفاده از داروها قطع نکنید. برای دستیابی به بهترین نتیجه تمام طول درمان خود را تحت نظر پزشک باشید تا به طور روتین شرایط شما بعد از مصرف داروی رزوواستاتین رصد و پایش شود. توقف ناگهانی مصرف قرص لیپومیس ممکن است باعث افزایش سطح کلسترول و تری‌گلیسیریدها شود بنابراین قبل از قطع مصرف، با پزشک خود مشورت کنید.
- به هیچ عنوان در طول درمان با داروی رزوواستاتین الکل مصرف نفرمایید چرا که سبب افزایش عوارض جانبی شود و اختلالات کبدی به همراه داشته باشد.

موارد منع مصرف داروی رزوواستاتین

اگرچه داروی رزوواستاتین به منظور درمان و بهبود اختلالات قلبی تولید شده است اما برای تمام اشخاص با این مشکلات تجویز نمی‌گردد. پزشک معالج با بررسی جنسیت، سن، شرایط فیزیکی و روانی، شدت و نوع بیماری، داروهای مصرفی مراجع و بیماری‌های زمینه‌ای به تشخیص صحیح می‌رسد و داروی مناسب را توصیه می‌کند. بنابراین مطلع کردن پزشک خود از شرایط فعلی شما بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند در روند درمان تاثیرگذار باشد. از موارد منع مصرف قرص لیپومیس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- حساسیت به داروی رزوواستاتین یا فرمولاسیون تشکیل‌دهنده آن
- حساسیت به دیگر استاتین‌ها و هم‌خانواده‌های داروی رزوواستاتین

- افراد مبتلا به بیماری‌های کبدی فعال و حاد
- بارداری و شیردهی
- میوپاتی یا افزایش کراتین کیناز

تداخلات دارویی رزوواستاتین

تداخلات دارویی زمانی رخ می‌دهند که مصرف همزمان دو یا چند دارو، اثرات یکی یا تمامی آن‌ها را تغییر دهد. این تغییرات می‌توانند به شکل افزایش یا کاهش اثرات دارو، یا بروز عوارض جانبی ناخواسته باشند. از بارزترین تداخلات دارویی قرص لیپومیس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- **سیکلواسپورین:** افزایش سطح داروی رزوواستاتین در خون
- **وارفارین:** افزایش خطر خونریزی
- **فیبرات‌ها:** افزایش خطر میوپاتی
- **آنتی‌اسیدها:** کاهش جذب داروی رزوواستاتین
- **اریترومایسین:** کاهش سطح رزوواستاتین در خون
- **داروهای ضد قارچ آزول:** افزایش سطح رزوواستاتین در خون

عوارض جانبی قرص لیپومیس

عوارض جانبی قرص لیپومیس واکنش‌ها و پیامدهای ناخواسته‌ای هستند که در نتیجه مصرف چند دارو، مکمل و یا سایر محصولات درمانی باشد. شدت این مشکلات می‌تواند خفیف، متوسط و شدید باشد ضمن اینکه در تمام افراد به یک شکل بروز نمی‌کند. قرص لیپومیس هم از این مورد مستثنی نیست و دارای عوارض جانبی است.

این واکنش‌ها به طور کلی به علت‌هایی نظیر واکنش‌های آلرژیک، تداخلات دارویی، دوز نامناسب، وضعیت سلامت فرد و ... به وجود می‌آید. از بارزترین عوارض جانبی داروی رزوواستاتین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مشکل در حافظه
- اختلال در خلق و خو مانند افسردگی
- درد مفاصل‌ها و سر درد
- عدم تعادل و سرگیجه
- اختلال در خواب و بی‌خوابی
- بی‌حوصلگی و خستگی مفرط
- کاهش مقدار ادرار یا ادرار تیره
- زردی پوست
- بثورات پوستی از جمله کهیر، خارش، تورم صورت و لب‌ها

- تحلیل عضلات و تاندون ها
- کبود شدن غیر طبیعی
- بی میلی شدید و از دست دادن اشتها

نتیجه گیری

قرص لیپومیس (داروی رزوواستاتین) از شرکت داروسازی کیش مدیفارم یک داروی موثر برای کاهش کلسترول و تری گلیسیریدها و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی است. این محصول دارویی با دوزهای ۵ میلی گرم، ۱۰ میلی گرم ۲۰ میلی گرم عرضه می گردد و در صورت تجویز پزشک متخصص در داروخانه های سراسر کشور قابل خریداری هستند.

داروی رزوواستاتین با مکانیسم خاص خود به بهبود سلامت قلب و عروق کمک می کند و می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران مؤثر باشد. با این حال، مصرف داروی رزوواستاتین باید تحت نظر پزشک باشد و نباید به توصیه های خودسرانه اکتفا شود. هرگونه تغییر در دوز یا توقف مصرف باید با مشورت پزشک انجام شود تا از عوارض جانبی و تداخلات دارویی جلوگیری گردد.