

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص موبیفارم | ملوکسیکام

اگر شما هم دردهای مفصلی را زیاد تجربه کرده باشید حتماً نام داروی ملوکسیکام یا قرص موبیفارم برایتان آشنا است. ملوکسیکام یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی به شمار می‌رود که با خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد دردی که دارد به عنوان یک مسکن درد شناخته می‌شود.

شرکت داروسازی کیش مدیفارم با تولید قرص موبیفارم که نام تجاری داروی ملوکسیکام بوده، توانسته کمک شایانی در زمینه‌ی تسکین دردها داشته باشد.

قرص موبیفارم در بسته‌های ۳۰ عددی به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی و در دوزهای ۷/۵ میلی‌گرم و ۱۵ میلی‌گرم تولید و عرضه می‌شود.

در ادامه به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم که قرص ملوکسیکام برای چیست؟ چه طور عمل می‌کند و موارد مصرف آن کدامند؟

مکانیسم عمل ملوکسیکام

برای شناخت مکانیسم عمل ملوکسیکام در ابتدا باید با واژه‌ی پروستاگلاندین آشنا شده باشید. در بدن آنزیم‌هایی وجود دارد به نام سیکلواکسیژناز، این آنزیم‌ها سبب افزایش ترشح پروستاگلاندین که مولد درد بوده، می‌شوند.

در واقع قرص موبیفارم با اثراتی که دارد، می‌تواند آنزیم‌های سیکلواکسیژناز را مسدود کند و از بروز پروستاگلاندین‌ها جلوگیری کند که نهایتاً منجر به کاهش درد و التهاب در بدن می‌شود. برخلاف برخی از NSAID های دیگر، ملوکسیکام به میزان کمتری آنزیم COX-1 را مهار می‌کند که در معده و کلیه‌ها نقش محافظتی دارد.

به همین دلیل، ملوکسیکام معمولاً عوارض گوارشی کمتری نسبت به NSAID های غیر انتخابی ایجاد می‌کند. به طور کلی مکانیسم اثر قرص موبیفارم سبب کاهش درد و التهاب خواهد شد.

موارد مصرف و فواید قرص موبیفارم

همان‌طور که گفته شد قرص موبیفارم با مهار پروستاگلاندین‌ها می‌تواند باعث کاهش درد شود و در دو دوز ۷,۵ میلی‌گرم و ۱۵ میلی‌گرم تولید می‌شود.

انتخاب دوز و زمان مصرف قرص موبیفارم بر عهده پزشک متخصص بوده و بهتر است از درمان‌های خودسرانه اجتناب بفرمایید. در ادامه به ذکر برخی از انواع درد که با قرص ملوکسیکام کاهش می‌یابند را نام برده‌ایم:

- کاهش دردهای ناشی از انواع جراحی‌ها مثل جراحی‌های قلب، دندان، عروق، دهان، فک، گوش و حلق
- انواع آرتریت از جمله آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک و استئوآرتریت
- تسکین دردهای ناشی از آسیب نخاعی و تنگی کانال نخاعی
- التهابات تاندونیت و بروسیت
- درمان دردهای رماتیسمی
- اسپوندیلیت انکیلوزان (روماتیسم ستون فقرات)

به یاد داشته باشید قرص موبیفارم به منظور درمان‌های کوتاه مدت توصیه می‌شود و مصرف ملوکسیکام در طولانی مدت می‌تواند خطر مشکلات معده را به همراه داشته باشد.

معمولا به همراه این نوع از داروها ممکن است پزشک داروی محافظت کننده از معده را تجویز می‌کند. می‌توانید قرص ملوکسیکام را به همراه غذا برای کاهش ترشحات معده میل بفرمایید.

موارد منع مصرف قرص موبیفارم

قرص موبیفارم یکی از بهترین راه‌های درمان انواع درد به شمار می‌رود اما باید به یاد داشته باشید این محصول دارویی برای تمام افراد احتمالا مناسب نیست.

تداخلات دارویی، سن، جنسیت، شدت بیماری و درد می‌تواند از عوامل موثر در انتخاب نوع دارو به حساب بیاید. بنابراین حتما پیش از مصرف هر دارو بروشور و داخل جعبه قرص را مطالعه بفرمایید و با پزشک متخصص خود مشورت کنید.

قرص موبیفارم برای مصرف در شرایط زیر جایز نیست:

- افراد با بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشار خون بالا، مشکلات قلبی و آسم همیشه باید طبق دستورات متخصص معالج قرص موبیفارم را مصرف کنند و یا در صورت تشخیص ایشان از جایگزین استفاده شود.
- افراد با سابقه مشکلات گوارشی از جمله خونریزی معده، نارسایی کلیه و کبد باید تحت نظر پزشک داروی جایگزین انتخاب کنند.
- این دارو در رده بارداری قرار دارد و ترشح آن در شیر مادر مشخص نیست و در این دوران نباید مصرف شود.
- حساسیت به داروی ملوکسیکام و مواد تشکیل‌دهنده قرص موبیفارم می‌تواند سبب بروز مشکلات خطرناک باشد.

- داشتن سابقه کهیر، واکنش‌های آنافیلاکتیک یا واکنش‌های آلرژیک پس از مصرف آسپرین یا سایر NSAID ها
- در صورتی که باردار هستید و یا قصد بارداری دارید بهتر است از داروی ملوکسیکام استفاده نفرمایید.

عوارض قرص موبیفارم | ملوکسیکام

عوارض دارویی یکی از شایع‌ترین مشکلاتی به شمار می‌رود که پس از مصرف محصولات دارویی به وجود می‌آید. اما آیا این فقط به علت نوع دارو است؟ خیر.

عوارض داروی ملوکسیکام هم مانند بسیاری از داروها می‌تواند به یکی از این علت‌ها باشد: سن، جنسیت، ژنتیک، نوع دارو، میزان دوز مصرفی، مصرف همزمان چند دارو و یا چند محصول، رژیم غذایی، مصرف دخانیات و الکل، حساسیت‌هایی دارویی و فرمولاسیو دارو.

ما در ادامه سعی کرده‌ایم رایج‌ترین عوارض قرص موبیفارم را به طور خلاصه ذکر کنیم:

- بثورات پوستی مانند کهیر، تورم و التهاب، خارش و اگزما در سطح پوست
- آریتمی، نارسایی قلبی، تپش قلب و آنفارکتوس قلبی
- مدفوع، ادرار و استفراغ آغشته به خون
- افزایش و کاهش فشار خون
- اسهال و سوء هاضمه
- درماتیت اکسفولیاتیو
- خشکی در دهان
- حساسیت به نور
- سندرم استیون
- یرقان
- نفخ

در صورتی که هر کدام از این عوارض قرص موبیفارم وخیم شدند خصوصا اگر استفراغ، ادرار و مدفوع شما حاوی خون و یا مواد قیری رنگ بود حتما در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بفرمایید.

تداخلات دارویی قرص موبیفارم | ملوکسیکام

تداخلات دارویی یکی از مهم‌ترین دلایل بروز عوارض هستند. این مشلات معمولا با مصرف همزمان چند دارو به وجود می‌آید و می‌تواند در فرآیند جذب

دارو در دستگاه گوارش، نحوه توزیع در بدن، نحوه دفع و متابولیسم فرد مصرف‌کننده را تحت شعاع قرار دهند.

تداخلات دارویی قرص موبیفارم می‌تواند مشکلات جبران ناپذیری به بار بیاورد که با رعایت چند نکته ساده و مطلع بودن از میزان و شیوه مصرف تا حد امکان از بروز این عوارض جلوگیری می‌شود. در ادامه به ذکر چند مورد از تداخلات دارویی قرص موبیفارم خواهیم پرداخت:

- داروهای ضد افسردگی مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) مثل فلوکسیتین، سیتالوپرام، فلوکسامین، و سرتالین
- مصرف همزمان با داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) دیگر
- داروهای رقیق‌کننده خون مانند آسپرین و وارفارین
- کورتیکو استروئیدها
- سیکلوسپورین
- متوترکسات
- لیتیوم

همیشه قبل از مصرف دارو، تمام شرایط پزشکی خود اعم از سلامت جسمانی، سابقه بیماری‌های ژنتیکی و داروهایی که مصرف می‌کنید را در اختیار پزشک معالج قرار دهید.

با بررسی وضعیت به صورت روتین پس از مصرف ملوکسیکام می‌توانید از بروز تداخلات دارویی قرص موبیفارم جلوگیری نمایید.

هشدارها و احتیاط‌های داروی ملوکسیکام

مانند هر داروی دیگری، داروی ملوکسیکام نیز دارای هشدارها و احتیاط‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. در ادامه به طور مفصل برخی از مواردی که در حین مصرف قرص موبیفارم باید به یاد داشته باشید را توضیح خواهیم داد:

- قرص موبیفارم می‌تواند باعث خونریزی، زخم و سوراخ شدن معده یا روده شود که ممکن است بدون علامت هشداردهنده و در هر زمانی از درمان رخ دهد و خطر آن در افراد مسن بیشتر است.
- افراد با سابقه بیماری‌های زمینه‌ای از جمله آسم، مشکلات تنفسی و حساس بودن به آسپرین داروی ملوکسیکام باید با احتیاط بیشتری مصرف شود.
- استفاده از قرص موبیفارم در زمان بارداری فقط تحت نظر و توصیه پزشک باید انجام شود و به هیچ عنوان در این دوران به طور خودسرانه هیچ دارویی مصرف نفرمایید. استفاده از داروی ملوکسیکام خصوصا در

۳ ماه سوم بارداری می‌تواند خطرات جدی برای جنین به همراه داشته باشد. در دوران شیردهی نیز این دارو باید کاملاً تحت نظارت متخصص مصرف شود.

- استفاده طولانی مدت از داروی ملوکسیکام خطر سکتع مغزی و مشکلات عملکرد قلب را به همراه داشته باشد و منجر به خطرات جبران‌ناپذیری شود. به هیچ عنوان از این دارو پس از عمل‌های جراحی بای‌پس عروق کرونری استفاده نفرمایید.
- از آنجایی که قرص موبیفارم می‌تواند اختلال در عملکرد کبد و کلیه را به همراه داشته باشد، افراد دارای مشکل در این نواحی بهتر است با دقت بیشتری و تحت نظر پزشک معالج آن را استفاده کنند.
- داروی ملوکسیکام در مواردی سبب افزایش فشار خون خواهد شد، بنابراین نیاز است اشخاصی که فشار خون بالا دارند با احتیاط از آن استفاده کنند.
- قرص موبیفارم باید در دمای پایین‌تر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد به دور از آفتاب و نور خورشید نگهداری شود. از انجماد دارو به شدت خودداری فرمایید.
- تمام محصولات دارویی باید دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که تا الان گفته شد، داروی ملوکسیکام یک داروی ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID) است که برای تسکین درد و التهاب در شرایطی مانند آرتريت استفاده می‌شود. یکی از محصولات گروه دارویی کیش مدیفارم تولید قرص ملوکسیکام ۱۵ و ۷,۵ میلی‌گرم است.

اکنون که می‌دانید قرص ملوکسیکام برای چیست، بهتر است با رعایت تمام نکات اعلام شده و پیروی از دستورات پزشک متخصص به درمان مشکلات نام برده شده، بپردازید.