



گروه دارویی کیش مدیفارم



مگافن سینوس کلد کیش مدیفارم

یکی از محصولات سبد مسکن درد مگافن، مگافن سینوس کلد است که با دارا بودن ترکیبات استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم، فنیل افرین هیدروکلراید ۱۰ میلی گرم و دیفن هیدرامین هیدروکلراید ۲۵ میلی گرم توانسته یک راه حل مفید برای درمان و تسکین بسیاری از دردهای خفیف تا متوسط باشد. این محصول دارویی در یک بسته بندی با ۳ بلیستر ۸ عددی در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید و عرضه می شود که با توجه به قیمت بسیار مناسب و دسترسی آسان، توانسته جای خود را در سبد داروخانه خانگی خیلی از افراد باز کند.

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که مگافن سینوس کلد چیست؟ چه کارایی دارد و چه زمانی باید مصرف شود؟ و یا عوارض مگافن سینوس کلد چیست؟ حتما تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

موارد مصرف مگافن سینوس کلد

مگافن سینوس کلد کیش مدیفارم حاوی ۳ ماده فعال اولیه یعنی استامینوفن، فنیل افرین و دیفن هیدرامین بوده، هرکدام از این اجزا نقش خاصی در عملکرد این دارو دارند.

استامینوفن به عنوان پایه تمام سبد مگافن ضد درد و ضد تب محسوب می شود، فنیل افرین یک مقلد سمپاتیک به شمار می رود که عروق خونی داخل بینی را منقبض می کند که نهایتا منتج به کاهش تورم و احتقان در بینی می شود.

دیفن هیدرامین یک آنتی هیستامین محسوب می شود. عملکرد دیفن هیدرامین علاوه بر عملکرد مشابه در آنتی هیستامین های دیگر یک داروی خواب آور موقت هم است، بنابراین در هنگام مصرف هرگونه دارو با ترکیبات دیفن هیدرامین از کارهایی که نیاز به تمرکز دارد، مانند رانندگی اجتناب کنید.

ترکیب این ۳ ماه اولیه، در مگافن سینوس کلد این دارو را برای مصارف زیر آماده کرده:

- ضددرد
- ضد تب
- آلرژی
- عطسه
- آنفولانزا
- سینوزیت
- سرماخوردگی
- آنتی هیستامین

- خارش و کهیر
- ضد احتقان سینوس‌ها
- عفونت‌های تنفسی خفیف
- ضد احتقان و آبریزش بینی

موارد منع مصرف مگافن سینوس کلد

اگرچه داروها برای درمان بیماری‌ها مفید هستند و شامل مزایایی هستند، اما همیشه و برای تمام افراد هم قابل استفاده نیستند، چرا که سن، جنسیت، شرایط سلامت جسمانی و مصرف داروهای دیگر به طور همزمان می‌تواند در انتخاب نوع دارو تاثیرگذار باشد.

داروی مگافن سینوس کلد هم با ترکیبات خاص خود برای افراد با برخی از شرایط مناسب نیست. افرادی که دارای سابقه بیماری‌های زیر هستند حتما تحت نظر پزشک متخصص باید داروی جایگزین انتخاب شود و یا کنترل شده از این محصول استفاده بفرمایند.

- افراد با حساسیت به هرکدام از ترکیبات مگافن سینوس کلد (استامینوفن، فنیل افرین و دیفن هیدرامین)
- داشتن انسداد در یکی از نواحی روده، معده و گردنه مثانه
- افراد دارای آب سیاه چشم با زاویه باریک
- مشکل‌های قلبی، کلیوی و کبدی شدید
- بزرگ شدن پروستات‌ها
- آسم و حملات آسمی
- پرکاری تیروئید
- اعتیاد به الکل
- هیپاتیت‌ها
- گلوکوم
- پولیپ
- دیابت

مصرف مگافن سینوس کلد در بارداری و شیردهی

اگر قصد بارداری دارید، باردار و یا شیرده هستید، در شرایط بسیار خاصی هستید و باید تمام دوران را تحت نظر پزشک متخصص باشید، مصرف هر دارویی هم در این دوره امکان پذیر نیست و باید از مصرف خودسرانه داروها خودداری کنید.

چرا که ممکن است روی سلامت مادر، نحوه زایمان و سلامت جنین تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه ترکیبات مگافن سینوس کلد روی شیر مادر اثر گذار است و وارد تغذیه کودک می‌شود، مصرف این دارو در شرایط شیردهی نیز توصیه نمی‌شود.

همچنین استفاده از مگافن سینوس کلد در زمان بارداری و اگر قصد بارداری را دارید باید با توصیه و تجویز پزشک باشد.

تداخل‌های دارویی مگافن سینوس کلد

تداخلات دارویی همیشه به معنی ایجاد مشکل نیست و به طور کل می‌تواند تاثیرگذاری این چینی داشته باشد:

- ✓ در برخی موارد اثرات مثبت یک یا هر دو دارو را از بین می‌برد
 - ✓ تاثیر متابولیسم داروها به طور کل دچار تغییرات شود
 - ✓ خطر افزایش برخی از بیماری‌های زمینه‌ای را دارد
 - ✓ خطرات جانبی ایجاد می‌کند
 - ✓ مسمومیت‌های دارویی را در بر دارد
 - ✓ می‌تواند مسبب بروز مشکلات جبران‌ناپذیری شود.
- مگافن سینوس کلد هم با مصرف هم‌زمان برخی از داروها ممکن است برخی از این تداخلات دارویی را ایجاد کند، از جمله این ماده و داروها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- الکل
- داروهای بیهوشی
- آدرنرژیک خوراکی
- آکالوئیدهای راولفیا
- گلیکوزیدهای دیژیتال
- داروهای ضد فشار خون
- داروهای مسدود کننده بتا
- داروهای ضد انعقاد خون
- داروهای آنتی کولینرژیک
- داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی
- داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (آمی تریپتیلین)
- مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (فنلزین، ترانیل سیپرومین)
- داروهای خواب آور و آرام بخش‌ها (بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها)
- داروهای ضد افسردگی (مهارکننده‌های باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین)

- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی شامل آسپرین یا سایر سالیسیلات ها و زیدوودین

مقدار، نحوه و زمان مصرف دارو مگافن سینوس کلد

همان طور که مقدار توصیه و تجویز شده دارو می تواند کمک به سزایی به درمان آن کند، قطعا مصرف بیش از اندازه آن نه تنها می تواند مسمومیت های دارویی را ایجاد کند، بلکه ممکن است عوارض زیادی را در بر داشته باشد.

مصرف بیش از اندازه داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی معمولا مشکلات گوارشی و داروهای حاوی استامینوفن مشکلات کبدی را ایجاد می کنند، بنابراین مصرف به اندازه دارو از واجبات است. از مصرف خودسرانه این داروها پرهیز شود.

- در افراد بزرگسال و یا ۱۲ سال به بالا هر ۴ الی ۶ ساعت در روز ۱ عدد قرص مصرف شود، لازم به ذکر است حداکثر ۸ عدد از مگافن سینوس کلد در طول روز می توان استفاده کرد.
- مگافن سینوس کلد با یک لیوان پر از آب مصرف شود، در صورتی که مشکل معده دارید این دارو را همراه با وعده غذا هم می توانید میل کنید.
- همچنین با توجه به دارا بودن دیفن هیدرامین در ترکیبات مگافن سینوس کلد، بهتر است این دارو در زمان کار با دستگاه های خطرناک، رانندگی، هنگام کار یا درس خواندن مصرف نشود. بهتر است این دارو چند سال قبل از ساعت خواب شما میل شود.
- در صورتی که با استفاده از مگافن سینوس کلد حال جسمانی شما بهتر نشد و یا وخیم تر شد، همراه با تب، راش پوستی و مشکلات تنفسی، حتما در اسرع وقت به اورژانس مراجعه کنید.
- مصرف مگافن سینوس کلد در کودکان و اشخاص مسن با توجه به اینکه بیشتر در مقابل داروها حساس هستند، ممکن است عوارض ناخواسته ای از جمله تحریک پذیری و خشم را به همراه داشته باشد.
- اگر به طور همزمان داروهای دیگری که شامل استامینوفن هستند، مصرف می کنید ممکن است این دارو سبب مسمومیت بر اثر استفاده بیش از حد استامینوفن و آسیب جدی به کبد شود.

عوارض جانبی مگافن سینوس کلد

اگرچه مگافن سینوس کلد برای تسکین بسیاری از مشکلات جسمانی مانند احتقان بینی و سینوس مفید به شمار می رود، اما ممکن است عوارض جانبی نیز به همراه داشته باشد که البته این مشکلات معمولا ارتباط مسقیمی به میزان دوز مصرفی و مدت دوره درمان دارد.

لازم به ذکر بوده، عوارض جانبی یک اصطلاح پزشکی محسوب می‌شود و به این معنی که با مصرف دارو احتمال دارد، اثرات ناخواسته منفی به همراه آن داشته باشد. از جمله عوارض جانبی که این دارو به دلیل محتویاتش احتمالا برای برخی از افراد در بر داشته باشد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- خستگی و ضعف زیاد
- خشکی بینی، گلو و دهان
- خارش، کهیر یا راش پوستی
- مدفوع خونی یا سیاه رنگ مانند قیر
- عصبانیت، بی‌قراری و تحریک‌پذیری
- تغییرات در ادرار و یا اشکال در دفع ادرار
- حالت تهوع یا استفراغ خون با موادی مشابه ذرات قهوه
- تورم صورت، پاها و بخش تحتانی ساق‌ها
- افزایش غیرعادی وزن یا بی‌اشتهایی
- خونریزی یا کبودی غیرعادی
- احساس فشار در قفسه سینه
- گلو درد، سردرد و تب
- درد در ناحیه معده

شرایط نگهداری مگافن سینوس کلد

برای اطلاع از شیوه نگهداری هر دارو بهتر است قبل از مصرف علاوه بر کنترل تاریخ انقضا، حتما بروشور داخل جعبه را به طور کامل مطالعه کنید، چرا که برخی از داروها یخچالی هستند و برخی دیگر در دمای اتاق نگهداری می‌گردند. معمولا اکثر داروها در دمای بین ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند. لذا رعایت نکات مهمی که در بروشور نوشته بسیار حائز اهمیت بوده و باید رعایت شوند.

- مگافن سینوس کلد باید در دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، در محلی خشک و دور از رطوبت، خنک، به دور از آفتاب و نور نگهداری شود. از یخ زدگی این دارو جلوگیری کنید.
- داروهای منقضی شده باید به روش صحیح طوری از بین بروند که شخص دیگری هم امکان استفاده و مصرف آن را نداشته باشد.
- بهتر است تمام محصولات دارویی از جمله مگافن سینوس کلد از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.

به یاد داشته باشید این اقدامات به هیچ عنوان جایگزین توصیه و تجویزهای پزشک متخصص نخواهد شد. لذا اولین مواردی که باید در حوزه سلامتی انجام شود، پیروی از دستورات پزشک معالج است.

Kishmedipharma