



گروه دارویی کیش مدیفارم



مگافن فلو کیش مدیفارم

سبد مسکن درد مگافن، بر پایه استامینوفن در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید و در داروخانه‌های سراسر کشور قابل خریداری است. این محصول دارویی از ترکیب استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرم و فنیل افرین ۱۰ میلی‌گرم فرموله شده و به قیمت مقرون‌به‌صرفه‌ای امکان خریداری دارد.

اگر این سوال را در ذهن خود دارید که مگافن فلو چیست و چه موارد مصرفی دارد؟ حتماً تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

موارد مصرف مگافن فلو کیش مدیفارم

فنیل افرین یک داروی ضد احتقان به شمار می‌رود که با باریک کردن رگ‌های خونی در بینی از ایجاد تورم و احتقان جلوگیری می‌کند. معمولاً فنیل افرین برای درمان نشانه‌های ناشی از سرماخوردگی، آنفولانزا و سینوزیت تجویز شده، همچنین در دیگر داروها فرموله می‌شود.

در مگافن فلو نیز از این داروی بی‌نظیر به منظور درمان رفع احتقان سینوسی استفاده شده است. مگافن فلو با هم افزایی استامینوفن و فنیل افرین امکان، بهبود و تسکین موارد زیر را دارد:

- ضد درد (سردرد، دندان درد، دردهای عضلانی و مفاصل، دردهای قاعدگی و پریودی)
- احتقان ناشی از سرماخوردگی، آلرژی‌ها، سینوزیت و آنفولانزا
- تب ناشی از عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی

موارد منع مصرف مگافن فلو کیش مدیفارم

اگرچه داروها به منظور افزایش سطح سلامت جامعه تولید می‌شوند، اما ممکن است مشکلاتی نیز به همراه داشته باشند. برای جلوگیری از این مشکلات ناخواسته بهتر بوده قبل از مصرف حتماً بروشور و داخل جعبه محصولات دارویی را به طور کامل بررسی کنید.

برخی از اختلالات به وجود آمده احتمال دارد بر اثر تداخلات دارویی و برخی دیگر به علت وضعیت سلامت جسمانی فرد است. از موارد منع مصرف مگافن فلو می‌توان لیست زیر را نام برد:

- بارداری و شیردهی
- افراد با سن پایین‌تر از ۱۲ سال
- مصرف همزمان یا در طی دو هفته اخیر با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز

- افراد با بیماری‌های زمینه‌ای مانند فشار خون بالا، مشکلات قلبی، اختلالات در کبد و کلیه
- مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن، داروهای ضد احتقان یا ضد سرفه و سرما خوردگی
- در صورت داشتن حساسیت به هرکدام از اجزای تشکیل‌دهنده داروی مگافن فلو (استامینوفن و فنیل افرین)

عوارض مگافن فلو کیش مدیفارم

در شرایط متفاوتی ممکن است مشکلات ناخواسته‌ای پس از مصرف یک دارو بروز دهد.

از این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مصرف بیش از اندازه یک دارو، استفاده به صورت طولانی مدت و یا همزمان با داروهای دیگر. عوارض مگافن فلو موارد زیر هستند:

- عوارض قلبی
- دیسکرازی خونی
- واکنش‌های آلرژیک
- سرگیجه و یا گیجی شدید
- تحریک سیستم اعصاب مرکزی
- هپاتیت (التهاب کبد) و سمیت کبدی
- تشدید عصبانیت و یا بی‌قراری شدید

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر بی‌قراری، تحریک‌پذیری، افزایش فشارخون، کند شدن ضربان قلب رفلکسی، اغتشاش شعور، توهم و حملات تشنجی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

تداخلات دارویی مگافن فلو کیش مدیفارم

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یکی از دلایل بروز عوارض می‌تواند تداخلات دارویی باشد. تداخلات دارویی در صورتی رخ می‌دهد که به صورت همزمان ۲ و یا چند دارو مصرف شوند.

این موضوع در اثرگذاری داروها مشکل ایجاد می‌کند، سبب بروز کاهش اثربخشی و یا افزایش آن می‌شود، همچنین احتمال دارد تأثیرات آن را به تعویق بیاورد. از داروهایی که با مصرف همزمان مگافن فلو تداخل ایجاد می‌کنند در ادامه نام برده‌ایم:

- پروبنسید
- بتابلوکرها
- دیگوکسین
- کلستیرامین
- گلیکوزیدهای قلبی
- آمین‌های سمپلتومیمیتیک
- کومارین‌ها (مانند وارفارین)
- داروهایی با احتمال سمیت کبدی
- داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز
- داروهای افزایش‌دهنده تخلیه معده (متوکلرپرامید)
- داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (آمی تریپیتیلین)
- داروهای القاکننده آنزیم‌های میکروزومی (الکل و داروهای ضد تشنج)
- داروهای کاهنده فشار خون (دبریزوکین، گوانتیدین، رزپین، متیل دوبا)
- داروهای کاهش‌دهنده تخلیه معده (پروپانتلین، داروهای ضد افسردگی با اثرات آنتی کولینرژیک، داروهای ضد درد مخدر)

در صورتی که مصرف کننده داروهای خاص هستید جهت تهیه مگافن و با پزشک متخصص یا داروساز مشورت کنید.

نکات و زمان مصرف مگافن فلو

نحوه و زمان مصرف مگافن فلو کیش مدیفارم یکی دیگر از نکاتی است که باید به آن توجه داشت، اگرچه ترکیبات این دارو استامینوفن و فنیل افرین هستند اما با وجود کم خطر بودن می‌توانند اختلالات و مشکلاتی را ایجاد کنند.

برای مصرف داروی مگافن فلو نیاز است از نکات زیر اطلاع داشته باشید:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. از یخ‌زدگی و گرمای بیش از اندازه جلوگیری بفرمایید.
- مگافن فلو را با یک لیوان پر از آب میل کنید تا از بروز مشکلات گوارشی جلوگیری نمایید. این دارو را می‌توان با غذا و یا بدون غذا میل کرد.
- افراد بالای ۱۲ سال نباید بیشتر از ۸ قرص مگافن فلو در روز مصرف کنند و بهتر است فاصله بین قرص‌ها هر ۴ الی ۶ ساعت در روز باشد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در صورتی که یک نوبت از مصرف مگافن فلو را فراموش کرده‌اید به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار مگافن فلو خودداری نمایید. از مصرف مقادیر یا دفعات

بیشتر از دستور راهنمای دارو خودداری نمایید، مگر اینکه پزشک متخصصی و معالج شما تجویز نموده باشد.

- این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته در کودک شیرخوار گردد بنابراین مصرف مگافن فلو در دوران شیردهی باید با نظر پزشک انجام گیرد.
- در صورت عدم بهبودی علائم و وخیم شدن آن‌ها و یا مشاهده تب بالا، با پزشک خود مشورت نمایید.
- این دارو ممکن است باعث عصبانیت، بی‌قراری یا مشکل در بخواب رفتن در برخی افراد گردد، لذا آخرین نوبت مصرف روزانه مگافن فلو را چند ساعت قبل از زمان خواب میل نمایید.
- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت‌دار پزشکی، پزشک یا دندان پزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

به یاد داشته باشید که تمام مطالب ذکر شده، صرفاً به علت مسئولیت اجتماعی ما که افزایش سطح آگاهی جامعه و معرفی محصول مگافن فلو است، لذا این موارد را به هیچ عنوان بر نظر و توصیه پزشک معالج خود ارجح نشمارید.