

# گروه دارویی کیشمدیفارم

user'

## مگافن پین کیش مدیفارم

دردهای وقت و بی وقت از معضلاتی است که در زندگی بارها و بارها به سراغ افراد می‌آید و معمولا برای درمان این‌گونه از مشکلات هر خانواده‌ای یک سبد دارویی مسکن درد، ضد التهاب و یا تسکین‌دهنده در خانه خود دارد.

اما چه دارویی باید انتخاب شود که علاوه بر مسکن درد بودن، عوارض کم‌تری داشته باشد و به سرعت انواع درد را تسکین دهد؟ قاعدتا این دارو باید ترکیبات منحصر به فرد و خاص خود را دارا باشد که امکان استفاده در بسیاری از موارد را فراهم کند.

پیشنهاد ما به هر خانواده، داشتن سبد کامل **مسکن درد مگافن** است، این سبد برای سن‌ها و شرایط مختلف فرموله می‌شود. سبد مگافن شامل انواع قرص، کپسول و شربت بوده که به تسکین دردهای خفیف، متوسط و شدید از جمله میگرن، سرماخوردگی، آنفولانزا، تب، درد، سرفه، سینوزیت و ... تولید و روانه بازار شده است.

یکی از انواع مگافن‌ها، مگافن پین نام دارد، این مسکن درد یک داروی همه کاره به شمار می‌آید که با ترکیبات خود سریعا دردهای ایجاد شده را تسکین می‌دهد. مگافن پین چیست؟ این دارو چه ترکیبات و موارد مصرفی دارد؟ آیا مصرف بیش از اندازه مگافن پین ضرر و عوارضی ایجاد می‌کند که ما در ادامه به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

### مگافن pain یا مگافن پین چیست؟

تمام سبد دارویی مگافن بر پایه ماده فعال استامینوفن فرموله و تولید شده ، مگافن پین نیز یکی از انواع مسکن درد خانواده مگافن‌ها به حساب می‌آید که حاوی ۳۲۵ میلی‌گرم استامینوفن، ۴۰ میلی‌گرم کافئین و ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین است. در واقع این محصول دارویی با داشتن ترکیبات Acetaminophen + Caffein + Ibuprofen توانسته یک ضد درد همه کاره به حساب بیاید.

هرکدام از جزییات این دارو دارای ویژگی‌های خاصی هستند و در آرامش بخشیدن دردها نیز نقش به سزایی دارند. این محصول دارویی به صورت کپسول در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید و ارائه می‌شود.

استامینوفن یکی از امن، کم‌خطر و بهترین ماده‌های دارویی به شمار می‌آید که در این محصول به اندازه ۳۲۵ میلی‌گرم از آن استفاده شده است. استامینوفن در مگافن پین نقش ضد تب و ضد درد را بازی می‌کند و با کاهش ماده شیمیایی پروستاگلاندین که مسبب درد در بدن می‌شود، به کاهش درد کمک خواهد کرد.

مصرف استامینوفن به تنهایی در داروهای استامینوفن مگافن ۳۲۵ و استامینوفن مگافن ۵۰۰ می‌تواند به تسکین دردها کمک کند، اما در مگافن Pain با هم نشینی با ایبوپروفن و کافئین نقش پررنگ‌تری را دارد. به طور کل وجود استامینوفن در هر دارویی به عنوان یک آرام بخش برای دردهای خفیف تا متوسط از جمله سر درد، دردهای ناشی از آنفولانزا و سرماخوردگی، دردهای تنشی مانند سیاتیک و نوروپاتی است.

به یاد داشته باشید مصرف استامینوفن به مقدار زیاد ممکن است خطر مشکلات کبدی را افزایش دهد و یا با داروهای رقیق کننده خون تداخل دارویی ایجاد کند. از مصرف هر زمان هرگونه دارو با محتویات استامینوفن و الکل جدا خودداری کنید.

## نقش کافئین در سرعت بخشیدن به درمان و استفاده از آن در مگافن پین

در اینجا به بررسی مفصل‌تری از کافئین می‌پردازیم تا بدانیم کافئین در مگافن پین چه نقشی دارد. مکانیسم اثر کافئین به این صورت است که با مسدود سازی گیرنده‌های آدنوزین، افزایش آزاد شدن اسیدهای چرب برای منشاهای سوخت و ساز بدن و افزایش سروتونین، دوپامین، نوراپی نفرین و اندروفین در مغز، باعث می‌شود در محصولات دارویی متنوع به کار گرفته شود و سبب بهینه‌سازی عملکردهای ورزشی، تسکین دردها، کاهش خستگی، بهبود اخلاق و رفتار می‌شود.

لازم به ذکر است از کافئین در داروهای متفاوتی از جمله مسکن‌های درد، نوشابه‌های انرژی زا، داروهای آنتی دپرسانت یا ضد افسردگی استفاده می‌شود.

**شاید برای شما هم جالب باشد که کافئین در یک محصول دارویی چه می‌کند؟** چرا یکی از مهم‌ترین ترکیبات سبب مگافن‌ها کافئین است؟ کافئین به اندازه ۴۰ میلی‌گرم در مگافن پین استفاده شده و مانند یک کاتالیزور عمل می‌کند و سبب افزایش جذب ماده اولیه استامینوفن و افزایش سرعت آرام شدن درد را دارد. بررسی اثر بخشی ایبوپروفن در تسکین دردها در مگافن پین

ایبوپروفن به عنوان یک ضد التهاب غیر استروئیدی یا NSAID در مسکن درد مگافن پین به اندازه ۲۰۰ میلی‌گرم مصرف شده است. این ماده فعال به عنوان یک ضد درد و ضد التهاب عمل می‌کند و آنزیم‌های COX یا سیکلو اکسیژناز که سبب افزایش پروستاگلاندین‌ها می‌شوند را مهار می‌کند. مصرف بیش از اندازه ایبوپروفن می‌تواند افزایش ریسک مشکلات معده را به همراه داشته باشد، بنابراین به صورت طولانی مدت نباید از داروهای حاوی ایبوپروفن استفاده کرد.

از آنجایی که ایبوپروفن به تنهایی سبب تسکین دردهای قاعدگی، آرتریت، درد گوش، سینوزیت، دردهای ناشی از کشیدگی تاندوم و دندان درد می‌شود با وجود استامینوفن در کنار خود یک هم افزایی بی‌نظیر را ایجاد می‌کند. مگافن پین با دارا بودن ۳ جز اصلی هوشمندانه بسیاری از دردها را کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد که در ادامه به موارد مصرف این دارو، با ترکیبات بی‌نظیری که داراست می‌پردازیم.

### موارد مصرف مگافن پین

کپسول مگافن pain که به نام‌های مسکن ترکیبی یا مسکن درد سه ترکیب هم در بین افراد بسیاری شناخته می‌شود. یکی از بهترین داروها برای تسکین بسیاری از دردها و مشکلات جسمانی است.

این دارو بدون نسخه در داروخانه‌های سراسر کشور قابل خرید و تهیه بوده، ضمن اینکه با توجه به قیمت مقرون به صرفه آن، یکی از اولین انتخاب‌ها برای حضور همیشگی در سبد داروخانه‌ی خانگی شما محسوب می‌شود.

بهتر است در زمان سفر حتما تمام سبد دارویی مگافن را در چک لیست خود بگنجانید و در چمدان خود به عنوان ابتدایی‌ترین موارد ضروری در سفر به همراه خود داشته باشید.

این دارو یک ضد التهاب غیر استروئیدی محسوب می‌شود و برای تسکین بسیاری از دردهای خفیف تا متوسط توسط متخصصین نیز تجویز و توصیه می‌شود. در ادامه به ذکر برخی از دردهایی که مگافن پین می‌تواند مسکن خوبی برای آن محسوب شود، خواهیم پرداخت:

- میگرن و سردرد
- ضد تب و ضد درد
- دندان درد و آبسه دندان
- دردهای عضلات و مفاصل بدن
- درد ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا
- دردهای عصبی مثل سیاتیک و نوروپاتی
- دردهای به وجود آمده بعد از عمل جراحی

- دیسمنوره، دردهای قاعدگی یا دردهای پریودی
- انواع آرتрит از جمله استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد

### موارد منع مصرف مگافن پين

اگرچه داروها شامل مزيت‌هايي براي سلامت جسماني هستند، اما اين مورد براي تمام افراد صدق نمي‌کند و ممکن است شامل تمامي شرايط نشود. شرايط سلامت جسماني فرد، داروهائي که هم زمان مصرف مي‌کند، علت درد، سن و جنسيت مي‌تواند از مهم‌ترين فاکتورهاي انتخاب يک محصول دارويي باشد.

مصرف مگافن پين هم از اين قاعده مستثني نيست و مي‌تواند در برخي از شرايط عوارض و مشکلاتي به همراه داشته باشد. در ادامه بعضي از شرايط خاص که بايد به آن در حين درمان توجه کرد را نام برده‌ايم و توضيح داده‌ايم.

- در صورت حساسيت به ديگر ضد التهاب‌هاي غير استروئيدی مانند آسپيرين و يا آلرژي به هرکدام از ترکيبات مگافن پين يعني ايبوپروفن، استامينوفن، کافئين نبايد از مگافن پين استفاده کرد.
- در صورت داشتن مشکل در عملکرد کبدی و کليوی و يا داشتن سابقه مشکلات گوارشي حاد مانند خونريزي معده مصرف اين دارو توصيه نمي‌شود.
- در ۳ ماه پاياني بارداری مصرف اين دارو اکيدا ممنوع است، چرا که مي‌تواند به جنين آسیب بزند.
- بالا بودن فشار داخل جمجمه به دنبال صدمات وارد به سر
- افراد مبتلا به پولیپ بينی، آنژیوادم و اسپاسم برونش
- داشتن عفونت‌هاي شديد در بدن
- وجود بيماري‌هاي قلبی عروقی
- داشتن سابقه فشار خون بالا
- جراحی بای پس عروق کرونر
- داشتن سابقه اولسر پپتيک
- الکسيم حاد

### عوارض کپسول مگافن پين

هميشه تمام داروها نتيجه مثبت ندارند، در صورت مصرف بيش از اندازه، داشتن حساسيت و آلرژي، تداخلات دارويي، سلامت جسماني و ... ممکن است مصرف مگافن پين هم عوارضی به همراه داشته باشد. از جمله اين عوارض مي‌توان به موارد زير اشاره کرد.

- مشکل و بروز اختلالات در تنفس
- آسیب‌های کبدی و کلیوی
- حالت تهوع و استفراغ
- سردرد و سرگیجه
- اسهال یا یبوست
- اختلالات خونی
- بثورات پوستی
- لرزش عضلات
- وزوز گوش
- بی‌خوابی

## زمان مصرف مگافن پین

مگافن پین معمولا بسته به شدت درد هر ۶ الی ۸ ساعت مصرف می‌شود و در صورتی که ناراحتی معده دارید می‌توانید این محصول را همراه با غذا میل کنید. کپسول مگافن پین مناسب درمان‌های کوتاه مدت است و به هیچ عنوان نباید یک درمان بلند مدت در نظر گرفته شود.

به طور کل در طول روز نهایتا ۶ عدد از مگافن pain می‌توان مصرف کرد و کم‌ترین زمانی که بین دوزهای مصرفی مگافن پین است باید ۴ ساعت باشد.

کپسول مگافن پین معمولا بعد از ۴۵ دقیقه شروع به اثرگذاری می‌کند و بسته به شدت درد می‌تواند تا ۲۴ ساعت تاثیرگذار باشد. با توجه به دارا بودن کافئین در ترکیبات مگافن پین، بهتر است این دارو ظهر یا عصر میل شود تا باعث اختلال در خواب شب شما نشود.

## شرایط و نکاتی در مورد مصرف داروی سه ترکیبه مگافن

### پین

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در زمان مصرف هر دارویی باید رعایت کنید، خواندن بروشور داخل جعبه محصولات دارویی به حساب می‌آید.

بهتر است به جای خرید تک بلیستر (ورق قرص و یا کپسول) مسکن درد مگافن پین را به صورت بسته‌ای تهیه کنید، چرا که همیشه امکان مطالعه و یادآوری شرایط استفاده از آن را دارید. لازم به ذکر بوده تمام نکاتی که ذکر می‌شود، فقط به منظور بالا بردن سطح آگاهی جامعه است و قطعا جایگزین توضیه پزشک نخواهد شد.

- با کپسول مگافن پین به اندازه کافی آب میل کنید تا دچار افزایش اسید معده نشوید.

- حداقل ۱۵ دقیقه بعد از مصرف مگافن pain دراز نکشید تا دچار مشکلات گوارشی نشوید.
- با توجه به دارا بودن کافئین در ترکیبات مگافن پین، آن را در زمان خواب خود مطلقاً مصرف نکنید.
- اگر یک دوز مصرف را فراموش کردید، در صورتی که نزدیک به دوز بعدی است فقط به مقدار یک بار استفاده کنید و از مصرف دو برابر دارو خودداری کنید.
- دارو دور از نور و رطوبت و در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود، از یخ زدگی و انجماد مگافن پین جلوگیری کنید.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- کپسول مگافن pain در ۳ بلیستر ۸ عددی در داروخانه‌های سراسر کشور قابل خریداری است.
- این دارو برای افراد بالای ۱۲ سال مصرف می‌شود.
- در صورتی که قصد بارداری دارید، شیرده و یا باردار هستید، مگافن پین را تحت نظر متخصص مصرف کنید.