




گروه دارویی کیش مدیفارم





پماد کلوبتازول چیست؟



پماد کلوبتازول کیش مدیفارم

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که کلوبتازول چیست؟ پماد کلوبتازول برای میخچه تجویز می‌شود؟ یا لوسیون کلوبتازول برای پسوریازیس توسط پزشک متخصص توصیه می‌شود یا خیر؟ کلوبتازول پروپیونات یکی از انواع قوی‌ترین کورتیکواستروئیدها می‌باشد که به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و خاص خود یکی از اولین انتخاب‌های متخصصین است، این دارو در اشکال کرم، پماد، فوم و کف، لوسیون، شامپو و اسپری تولید می‌شود.

محصول مذکور با نام پماد کلوبتازول کیش مدیفارم و کرم کلوبتازول کیش مدیفارم در این اشکال نام برده، با دوز ۰/۰۵ درصد تولید و در سطح کشور عرضه می‌شود.

در صورت توصیه و نسخه پزشک به راحتی می‌توانید این دارو را از داروخانه‌های سراسر کشور تهیه و خریداری کنید. لازم به ذکر است کلوبتازول پروپیونات یکی از داروهای ژنریک محسوب می‌شود، که از ویژگی‌های بارز این نوع از محصولات قیمت مقرون‌به‌صرفه آن‌ها است.

موارد مصرف پماد کلوبتازول

از آنجایی که کلوبتازول پروپیونات در درمان برخی از مشکلات پوستی یکی از مورد استفاده‌ترین داروها محسوب می‌شود، شرکت داروسازی کیش مدیفارم

در راستای بهبود سطح سلامت جامعه این دارو را برای رفع و تسکین برخی از این مشکلات پوستی تولید کرده است.



موارد مصرف پماد کلوبتازول

بنابراین این محصول برای تسکین التهاب و خارش ناشی از برخی مشکلات پوستی بسیار کارآمد است. در ادامه برخی از موارد مورد استفاده پماد کلوبتازول کیش مدیفارم را نام خواهیم برد:

- پسوریازیس (یک بیماری پوستی مزمن که با حمله سلول‌های ایمنی بدن به سلول‌های سالم معمولا در سطح آرنج، زانو و پوست سر موجب التهاب و پوسته پوسته شدن می‌شود. در درمان این نوع از مشکل پوستی از پماد کلوبتازول برای تسکین و درمان می‌توانید با تجویز پزشک استفاده بفرمایید).
- التهاب‌های ناشی از گزش بند پایان و حشرات
- افزایش سفیدی واژن و کاهش خارش آن
- کاهش سوختگی‌های درجه ۱ و ۲
- اگزما یا درماتیت آتوپیک
- درماتیت سبورئیک
- کاهش لکه صورت
- آفتاب سوختگی
- آلورپیسی آزه آتا
- کاهش التهاب
- لیکن پلانوس

• راش شدید

مواردی که در بالا ذکر شد می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار باشند، برای مثال پماد کلوبتازول برای لک می‌تواند موثر باشد، البته به صورت خاص برای این مورد تجویز نمی‌شود و می‌تواند جایگزین‌های سبک‌تری نیز داشته باشد.

یکی از سوالات افراد در هنگام مراجعه به داروخانه این است که آیا پماد کلوبتازول برای درمان میخچه استفاده می‌شود یا خیر؟ این دارو برای درمان میخچه و این گونه مشکلات که پوست ضخیم و یا زخم است استفاده نمی‌شود و به جای مصرف خود سرانه از پماد کلوبتازول برای میخچه می‌توان در صورت تشخیص پزشک از اسید سالیسیلیک استفاده کرد.

همچنین از تاثیرات غیر مستقیم پماد کلوبتازول برای سفیدی و خارش واژن می‌توان نام برد، که البته ممکن است با مصرف این دارو خارش واژن بیشتر شود، چرا که در ابتدا باید علت این عارضه توسط پزشک تشخیص داده شود.

از عوارض مصرف طولانی مدت این دارو خستگی، اضطراب، سرگیجه، غش، فشار خون پایین، تغییر رنگ در محل استفاده و نازک شدن پوست را می‌توان نام برد که ممکن است منتج به کشسانی شدن پوست شود.

بنابراین در نظر داشته باشید میزان دوز و طول درمان کرم کلوتریمازول و پماد کلوتریمازول به تشخیص پزشک است اما معمولاً بیش‌تر از ۴ هفته تجویز نمی‌شود. عارضه نازک شدن پوست مهم‌ترین موردی است در استفاده از کورتون‌های موضعی باید به آن توجه داشت. توصیه می‌شود مجدد در متن به این موضوع اشاره شود. همچنین استفاده طولانی مدت که منجر به این عارضه می‌شود با تاکید بیشتری ذکر شود.



مکانیسم اثر پماد کلوبتازول

این دارو با مکانیسم اثر خاصی که دارد یک تسکین‌دهنده قوی به حساب می‌آید و موجب کاهش التهاب، خارش، درد و تورم در پوست می‌شود. ممکن است پزشک مصرف کرم کلوبتازول یا پماد کلوبتازول را به صورت موضعی، به همراه داروهای خوراکی تجویز کند.

خوب است بدانید که این گونه داروها چون به صورت سیستمیک جذب ندارند در صورت رعایت نکات ذکر شده، عوارضی در تمام بدن به جای نمی‌گذارند. لازم به ذکر است عوارض سیستمیک در صورتی به وجود می‌آید که دارو جذب خون شود، این مورد معمولاً از طریق مصرف داروهای خوراکی

یا استفاده به صورت طولانی مدت این گونه داروهای موضعی و یا باندپیچی کردن بعد از مصرف داروی موضعی اتفاق می افتد.



مکانیسم اثر کلوبتازول



به طور کلی پماد کلوبتازول اینگونه عمل می کند:

- کاهش التهاب از طریق مهار پروستاگلاندین ها (آنزیم های مولد درد و التهاب) و لکوترین ها که موجب بروز حساسیت های پوستی و التهاب می شوند از وظایف پماد کلوبتازول است.
- در برخی موارد پاسخ های سیستم ایمنی بدن منتج به التهاب و واکنش های پوستی می شود که کرم و یا پماد کلوبتازول با مهار این پاسخ ها به کاهش پاسخ سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
- یک سری از پروتئین ها مانند سایتوکاین بعد از بروز التهاب ها سلول های ایمنی بدن را به آن نقطه از بدن فرا می خوانند که سبب ملتهب تر شدن این قسمت می شوند، پماد کلوبتازول از تولید این پروتئین ها جلوگیری می کنند.

همان طور که اشاره کردیم این ماده دارویی بسیار قوی است، بنابراین باید با تجویز پزشک و طبق دستورالعمل از آن استفاده کرد، ضمن اینکه طول درمان ممکن است به فرم دارو هم بستگی داشته باشد.

لازم به ذکر بوده برای درمان پسوریازیس از دوز بیشتر توصیه پزشک متخصص تجاوز نکنید و حتما طبق اندازه ای که توصیه شده روی قسمت های پسوریازیس بمالید.

بعد از استعمال پماد کلوبتازول به هیچ عنوان قسمت آسیب دیده را باند پیچی نکنید چرا که ممکن است باعث تحریک پوست و افزایش احتمال بثورات پوستی و یا اینکه جذب پوست شود. به انضمام اینکه مصرف این دارو برای افراد کمتر از ۱۸ سال به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.


مصرف کرم کلوبتازول با برخی از کورتیکواستروئیدها ممکن است سبب افزایش سطح استروئید در بدن شما شده و منتج به بروز سندرم کوشینگ شود و یا در عملکرد غده‌های فوق کلیوی اختلال ایجاد کند. این نکته را در نظر داشته باشید صرفاً تداخل‌های دارویی مضر نیستند و می‌توانند عملکرد هر دارو را مختل کنند.

این دارو در رده C بارداری قرار دارد اگر باردار هستید، قصد بارداری دارید و یا شیرده هستید، مصرف این دارو را فقط تحت نظر پزشک متخصص انجام دهید.

همچنین در افراد مسن با توجه به اینکه کبد، قلب و کلیه‌ها ممکن است مانند قبل به خوبی کار نکنند، داروها احتمالاً جذب کم‌تری دارند و طولانی‌تر باقی می‌مانند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جبران ناپذیری شود.

نگهداری و نکات مهم در مورد پماد کلوبتازول

این دارو مانند دیگر محصولات دارویی نیازمند نگهداری با شرایط خاص خود است. حتماً در نظر داشته باشید قبل از مصرف هرگونه دارو بروشور داخل آن را به دقت مطالعه کنید و در صورتی که پماد کلوبتازول تغییرات رنگ و بو داشت از استفاده آن خودداری کنید. برخی از نکات مهم در ادامه ذکر شده‌اند:



نگهداری و نکات مهم در مورد پماد کلوبتازول

- پماد کلوبتازول باید در دمای ۳۰ درجه نگهداری شود و از یخزدگی آن لطفا جلوگیری کنید.
- این محصول دارویی باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
- از تماس این دارو به نواحی زیربغل، چشم، دهان، بینی و کشاله ران جدا خودداری کنید و فقط پماد کلوبتازول را محدود به نقطه‌ای که دارای مشکل پوستی است کنید.

نتیجه‌گیری

هدف ما این است که به افزایش سطح سلامت جامعه کمک کنیم و اطلاعات افراد را از داروهای مصرفی بالا ببریم، اما باید به این نکته توجه کرد که هر دارو ممکن است روی هر شخص تاثیر منحصر به فردی داشته باشد، بنابراین ذکر نکات گفته شده به هیچ عنوان جایگزین توصیه‌های پزشک متخصص نخواهد شد.