



گروه دارویی کیش مدیفارم



ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم

ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم همان‌طور که از نام آن مشخص است در شرکت داروسازی کیش مدیفارم و در خط تولید نیمه جامدات تولید شده است. ماده موثره موجود در این محصول دارویی ۱۰٪ بوده و مکانیسم عمل این ژل به این صورت بوده که با آزاد سازی تدریجی ید معدنی در واژن باعث از بین رفتن انواع ارگانیس‌های بیماری‌زا در مخاط‌ها می‌گردد.

ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم خواص ضد باکتریایی و ضد عفونی‌کننده دارد. از این محصول دارویی به عنوان یک راهکار بهداشتی و درمانی برای بانوان استفاده می‌گردد. از مزیت‌های این محصول فرمت ژل آن بوده که به سرعت جذب شده و اثرگذاری خوبی را به همراه دارد.

موارد مصرف ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم

همان‌طور که گفته شد ژل واژینال مدیفارم خاصیت ضد عفونی‌کنندگی واژن را دارد و توسط پزشک متخصص زنان توصیه و تجویز می‌گردد.

- **درمان عفونت‌های واژینال:** کمک به درمان عفونت‌های قارچی یا باکتریایی.
- **پیشگیری از عفونت:** استفاده در دوران بارداری یا پس از زایمان برای پیشگیری از عفونت (فقط با تشخیص پزشک متخصص)
- **کاهش التهاب:** کاهش التهاب و ناراحتی در ناحیه واژینال.
- **بهبود بهداشت واژینال:** به عنوان یک محصول بهداشتی برای حفظ بهداشت ناحیه واژن.
- **کمک به تعادل pH:** کمک به تنظیم و حفظ pH طبیعی واژن.

پیش از مصرف ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم موضع و دست‌های خود را با آب ولرم و شوینده مناسب به خوبی شستشو داده و خشک نمایید. با استفاده از یک اپلیکاتور یا انگشت ژل را در موضع استعمال کنید. میزان مصرف و طول درمان مشکلات واژینال با کمک ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم فقط با تشخیص پزشک معالج بوده و بستگی به میزان و شدت عارضه دارد.

در صورتی که در شرایط خاصی هستید (اقدام به بارداری، بارداری، شیردهی و یا مصرف داروهای دیگر) حتماً پزشک معالج خود را در جریان قرار دهید.

موارد منع مصرف ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم

ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم اگرچه به منظور درمان تولید شده اما برای تمام افراد ممکن است مناسب نباشد و موارد منع مصرفی دارد. در

ادامه برخی از موارد احتیاط یا منع مصرف ژل واژینال پوویدون آیداین را نام خواهیم برد:

- حساسیت به مواد تشکیل دهنده ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم (افراد حساس به ید و مشتقات آن)
- در صورت داشتن بیماری کلیوی یا اختلال تیروئید (هایپرتیروئیدیسم یا هایپوتیروئیدیسم)
- سوختگی، زخم و عفونت‌های شدید در ناحیه واژن
- خانم‌های باردار و شیرده (به خصوص در سه ماهه اول بارداری و شیردهی باید با احتیاط انجام شود. ید می‌تواند از طریق جفت به جنین منتقل شود یا از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل شده و روی عملکرد تیروئید جنین یا نوزاد تاثیر بگذارد.)
- افراد مبتلا به بیماری‌های خودایمنی
- ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت

عوارض جانبی ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم

اگرچه داروها به منظور درمان و کاهش مشکل به وجود آمده تولید می‌شوند اما ممکن است به علت تداخلات دارویی، وجود حساسیت، عدم رعایت میزان دوز مصرفی و ... مشکلات ناخواسته‌ای را به همراه داشته باشند.

عوارض جانبی خفیف، متوسط و شدید هستند که در برخی افراد سبب بروز معضلات نادری می‌گردد. در ادامه به ذکر برخی از عوارض جانبی ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم خواهیم پرداخت:

- التهاب
- خشکی واژن
- سوزش خفیف تا شدید
- درد دوره‌ای و یا درد مداوم واژن
- خارش، تورم یا قرمزی در موضع استفاده
- تغییر در رنگ ادرار، پوست و یا مخاط
- بروز حساسیت‌های شدید یا همان آنافیلاکسی
- علائم واکنش آلرژیک مثل کهیر و دشواری تنفس

در نظر داشته باشید در صورت شدت یافتن، مزمن و طولانی شدن هر کدام از این مشکلات سریعاً باید به پزشک متخصص و اورژانس مراجعه فرمایید.

نتیجه‌گیری

یکی از محصولات پرترفدار بهداشتی دارویی نزد متخصصین زنان ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم بوده که توسط شرکت داروسازی کیش مدیفارم با دوز ۱۰٪ تولید و عرضه می‌گردد. برای کاهش درد، خارش و التهاب، همچنین درمان عفونت‌های واژینال تجویز می‌شود.

پیش از مصرف ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم حتما پزشک خود را در جریان شرایط سلامتی و داروهای مصرفی خود قرار دهید تا بهترین تصمیم‌گیری و راه درمان به شما پیشنهاد شود.

همه اطلاعات ارائه‌شده درباره ژل واژینال پوویدون آیداین مدیفارم با هدف افزایش سطح آگاهی شما در مورد ویژگی‌ها، عوارض و کاربردهای این محصول بوده و صرفاً جهت معرفی بهتر آن استفاده می‌شود. با این حال، توجه داشته باشید که این اطلاعات نمی‌تواند جایگزین توصیه‌ها، تشخیص‌ها و درمان‌های پزشکی شما از سوی پزشک متخصص باشد. برای استفاده صحیح از این محصول و اطمینان از مناسب بودن آن برای شرایط خاص شما، همواره باید با پزشک معالج خود مشورت کنید. تصمیم‌گیری نهایی در مورد درمان به‌طور کامل بر اساس نظر پزشک خواهد بود.