

گروه دارویی کیش مدیفارم

قرص کارودیلول

قرص کارودیلول یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم است که در دوزهای ۶,۲۵ میلی‌گرم، ۱۲,۵ میلی‌گرم و ۲۵ میلی‌گرم تولید می‌شود. داروی کارودیلول به عنوان یک بتا بلاکر برای کنترل فشار خون بالا و نارسایی قلبی مزمن استفاده می‌گردد.

همان‌طور که گفته شد قرص کارودیلول یکی از بتا بلاکرهاي شناخته شده است که به طور گسترده‌ای برای مدیریت فشار خون بالا و نارسایی قلبی استفاده می‌شود. این دارو با مسدود کردن گیرنده‌های بتا آدرنرژیک در قلب و عروق خونی عمل می‌کند، که منجر به کاهش فشار خون و بهبود عملکرد قلب می‌گردد. داروی کارودیلول به صورت خوراکی مصرف شده و برای دستیابی به بهترین نتایج، باید به طور منظم و مطابق با دستور پزشک استفاده گردد.

داروی کارودیلول با مسدود کردن گیرنده‌های بتا آدرنرژیک، مسدود کردن گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک و خواص آنتی‌اکسیدانی که دارد به کاهش فشار خون و بهبود سلامت قلب کمک می‌کند.

موارد مصرف قرص کارودیلول

قرص کارودیلول در شرکت داروسازی کیش مدیفارم تولید شده و در دسته داروهای قلبی به شمار می‌رود. این محصول دارویی مورد توجه پزشکان متخصص قلب بوده و در بسیاری از مواقع داروی کارودیلول را به مراجعه‌کننده تجویز می‌کنند. در ادامه به برخی از موارد مصرف قرص کارودیلول خواهیم پرداخت:

- کاهش فشار خون
- ضد هایپرتانسیون
- کمک به درمان نارسایی قلبی مزمن
- بهبود درد آنژین
- کاهش خطر بروز مشکلات قلبی
- درمان برخی از اختلالات ریتمی قلب
- فیبریلاسیون دهلیزی یا فلاتر

نکاتی در مورد مصرف قرص کارودیلول

توجه به نکات ساده در مورد مصرف قرص کارودیلول سبب کاهش عوارض جانبی و مشکلات ناخواسته خواهد شد. در ادامه برخی از موارد مهم در این خصوص را توضیح خواهیم داد:

- از خورد کردن، له کردن و شکستن قرص کارودیلول خودداری بفرمایید.

- در صورت انقضا، این محصول دارویی را به شکل صحیح و با کمک دکتر داروساز امحا کنید.
- از مصرف خودسرانه قرص کارودیلول و قطع ناگهانی آن جدا خودداری نمایید.
- ممکن است اثرگذاری این دارو تا ۲ هفته زمان ببرد.
- میزان مصرف و دوز مصرفی براساس تشخیص پزشک بوده اما معمولاً این محصول دارویی ۲ بار در روز همراه و یا بدون غذا میل می‌گردد.
- اگر داروی کارودیلول برای شما تجویز شده به هیچ عنوان آن را به دیگران توصیه نفرمایید.
- داروی کارودیلول باید دور از دسترس کودکان در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- در صورت فراموشی یک دوز از دو برابر کردن آن جدا خودداری نمایید و در صورتی که نزدیک به زمان مقرر مصرف دوز بعدی هستید در همان زمان مجدد به روال قبل بازگردید.
- قرص کارودیلول درمان فشار خون را در بر ندارد و فقط در کنار رژیم غذایی، ورزش و کنترل وزن می‌تواند به کنترل فشار خون بپردازد.
- بهتر است در طول درمان قرص کارودیلول مصرف مواد غذایی با سدیم بالا و نمک محدود شود.
- به هیچ عنوان در زمان استفاده داروی کارودیلول الکل مصرف نشود. افزایش خطر افت فشار خون، تشدید عوارض جانبی و تاثیر بر متابولیسم دارو می‌تواند از خطراتی باشد که در صورت همزمانی مصرف قرص کارودیلول و الکل رخ دهد.

موارد منع مصرف قرص کارودیلول

اگرچه قرص کارودیلول یکی از داروهای موثر در کنترل فشار خون و نارسایی‌های قلبی محسوب می‌شود اما برای تمام افراد با این مشکلات توصیه نمی‌گردد و برای به حداقل رساندن عوارض جانبی و خطرات جبران‌ناپذیر بهتر است به موارد منع مصرف قرص کارودیلول حداکثر توجه را بفرمایید. در ادامه به اصلی‌ترین موارد منع مصرف داروی کارودیلول خواهیم پرداخت:

- حساسیت به کارودیلول یا فرمولاسیون تشکیل‌دهنده
- نارسایی قلبی دچار دکمپنسیشن حاد
- بیماری‌های کبدی شدید
- بیماری‌های اسپاسم برونش از نوع غیرآلرژیک
- سابقه‌ی واکنش آنافیلاکتیک

- بارداری و شیردهی
- بیماری سینوس بیمار (Sick Sinus Syndrome)
- فئوکروموسیتوما بدون درمان
- آسم یا بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)
- برادی کاردی شدید (ضربان قلب کند)

تداخلات دارویی قرص کارودیلول

تداخلات دارویی معمولاً به علت تغییر در مکانیسم عمل داروها رخ می‌دهند. تداخلات دارویی قرص کارودیلول می‌تواند منجر به تأثیر بر عملکرد کبد، کلیه و اثرگذاری بر ضربان قلب را باشد. داروی کارودیلول می‌تواند اثرات داروهای ضد دیابت را تقویت کند و خطر هیپوگلیسمی را افزایش دهد.

مصرف همزمان قرص کارودیلول با داروهای ضد آریتمی مانند آمیودارون می‌تواند باعث کاهش شدید ضربان قلب و سایر مشکلات قلبی شود. استفاده داروی کارودیلول با داروهایی مانند وراپامیل و دیلتیازم منجر به افزایش خطر افت فشار خون و برادی کاردی گردد.

تداخلات دارویی قرص کارودیلول می‌توانند به دلیل مکانیسم‌های مختلف دارویی، مسیرهای متابولیک مشترک، رقابت برای پروتئین‌های حامل، تأثیرات فیزیولوژیک و عوامل شخصی و پزشکی رخ دهند. شناخت این تداخلات و مشورت با پزشک می‌تواند به کاهش خطرات و بهبود اثربخشی درمان کمک کند. به طور کلی قرص کارودیلول با داروهای زیر تداخل ایجاد می‌کنند:

- دیگوکسین
- نیفدپین
- آملودیپین
- وراپامیل
- ریبافلوکساسین
- سیتالوپرام
- فلکستین
- سروترالین
- دیلتیازم
- آتنولول
- متوپرولول
- پلاویکس
- الاسپران

- میتوماستین
- سایمتیدین
- رانیتیدین
- پراپرانولول
- الپرازولام
- دیازپام
- وارفارین

عوارض جانبی داروی کارودیلول

داروها به منظور پیشگیری، بهبود و درمان مشکلات تولید می‌شوند اما گاهی ممکن است برای فرد مصرف‌کننده مشکلاتی را به همراه داشته باشند. داروی کارودیلول نیز از این قاعده مستثنی نیست و عوارض جانبی به همراه دارد. در ادامه به طور خلاصه به ذکر برخی از عوارض جانبی قرص کارودیلول می‌پردازیم:

- برادری کاردی (ضربان قلب کند)
- احتباس مایعات و ورم
- افزایش وزن (به علت احتباس مایعات)
- مشکلات گوارشی از جمله اسهال
- مشکلات در خواب (بی‌خوابی یا کابوس)
- کاهش قند خون خصوصا در بیماران دیابتی
- مشکلات تنفسی و تنگی نفس
- سرگیجه و افت فشار خون
- تشنج و غش کردن
- افزایش وزن
- برنکو اسپاسم (انقباض عضلات صاف دیواره‌های برونش‌ها)
- تغییرات خلق و خو از جمله اضطراب و افسردگی

نتیجه‌گیری

قرص کارودیلول، تولید شرکت داروسازی کیش مدیفارم، در دوزهای ۶,۲۵، ۱۲,۵ و ۲۵ میلی‌گرم عرضه می‌گردد. این دارو عمدتاً برای درمان فشار خون بالا و نارسایی قلبی استفاده می‌شود و با مسدود کردن گیرنده‌های بتا و آلفا در سیستم عصبی، به کاهش فشار خون و بهبود عملکرد قلب کمک می‌کند.

مصرف داروی کارودیلول نیازمند توجه به نکات مهمی همچون دوز مصرفی، تداخلات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف و پایش منظم علائم است.

مصرف قرص کارودیلول ممکن است نیاز به نظارت منظم بر فشار خون و عملکرد قلب داشته باشد. پزشک احتمال دارد آزمایش‌های دوره‌ای را برای ارزیابی اثرات دارو تجویز کند.

استفاده از قرص کارودیلول باید تحت نظر پزشک صورت گیرد و نباید به اطلاعات عمومی اکتفا کرد. این توضیحات تنها جهت معرفی محصول است و تصمیم نهایی برای مصرف دارو باید توسط پزشک معالج اتخاذ شود.

Kishmedipharma