

گروه دارویی کیش مدیفارم

کپسول اورسوداکسی کولیک اسید

کپسول اورسوداکسی کولیک اسید ۲۵۰ میلی گرم یکی از انواع محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم به شمار می رود که به منظور درمان و مدیریت بیماری های مرتبط با کیسه صفرا و کبد توسط این گروه دارویی تولید می گردد.

کپسول اورسوداکسی کولیک اسید یک اسید صفراوی طبیعی است که به صورت مصنوعی تهیه و به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم عمل قرص اورسوداکسی کولیک اسید به گونه ای بوده که مورد توجه بسیاری از متخصصین است و برای افراد زیادی با مشکلات یاد شده تجویز می کنند.

کپسول اورسوداکسی کولیک اسید با تأثیر بر ترکیب صفرا، از تشکیل سنگ های صفراوی جلوگیری می کند و باعث حل شدن سنگ های صفراوی موجود می شود.

این اسید صفراوی با کاهش تولید کلسترول در کبد و کاهش ترشح آن به داخل صفرا، باعث کاهش اشباع صفرا از کلسترول و در نتیجه کاهش تشکیل سنگ های صفراوی می گردد.

همچنین، کپسول اورسوداکسی کولیک اسید با افزایش جریان صفرا و بهبود عملکرد کبد، به کاهش علائم بیماری های کبدی و صفراوی کمک می کند. این محصول دارویی در سراسر دنیا به شکل قرص اوراکسی کولیک اسید و کپسول آن تولید می شود.

موارد مصرف کپسول اورسوداکسی کولیک اسید

پیشگیری و درمان سنگ های صفراوی، بهبود عملکرد کبد، درمان کلانژیت صفراوی اولیه (PBC) از موارد مصرف کپسول اورسوداکسی کولیک اسید هستند.

میزان دوز مصرفی و نحوه استفاده از هر محصول دارویی فقط به تشخیص پزشک صورت می گیرد و توجه به نکات زیر در طول دوره درمان با کپسول اوراکسی کولیک اسید بسیار حائز اهمیت است.

- از باز کردن کپسول اورسوداکسی کولیک اسید، خوردن کردن و له کردن آن جدا خودداری بفرمایید.
- در طول درمان با قرص اورسوداکسی کولیک اسید نباید از رژیم غذایی و ورزش غافل شد.

- از مصرف خودسرانه و یا قطع مصرف بدون توصیه‌های پزشک متخصص اجتناب فرمایید.
- در صورت انقضا کپسول اورسوداکسی کولی اسید به طور صحیح آن را امحا کنید.
- این محصول دارویی باید در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از نور خورشید در جای خشک و خنک نگهداری شود.
- قرص اورسوداکسی کولیک اسید و کپسول آن به هیچ عنوان نباید در دوران ابتدایی بارداری خصوصاً ۳ ماه اول مصرف شود.
- از آنجایی که برخی از قرص‌های ضد بارداری باعث افزایش امکان سنگ‌های صفراوی می‌شوند در این دوران باید از راه‌های دیگر جلوگیری از بارداری بهره جست.
- بهتر است قرص اورسوداکسی کولیک اسید و یا کپسول آن را به منظور کاهش مشکلات گوارشی همراه با وعده غذایی میل فرمایید. (مصرف حتماً باید همراه غذا باشد)
- کپسول اورسوداکسی کولیک اسید به هیچ عنوان نباید در دسترس کودکان قرار گیرد.

موارد منع مصرف کپسول اورسوداکسی کولیک اسید

همان‌طور که پیش‌تر اعلام کرده‌ایم کپسول اورسوداکسی کولیک اسید به منظور بهبود عملکرد کبد و اختلالات کبدی مانند هپاتیت و کبد چرب غیرالکلی تجویز می‌شود اما برای تمام افراد توصیه نمی‌گردد.

بهتر است پیش از مراجعه به پزشک متخصص از رژیم غذایی، مکمل‌های غذایی، مکمل‌های گیاهی و داروهایی که استفاده می‌فرمایید لیست کاملی تهیه کنید و به دکتر خود ارائه دهید. ارائه اطلاعات مهم مذکور می‌تواند کمک به‌سزایی به تشخیص درست و تجویز مناسب کند.

عوامل زیادی در عدم تجویز یک دارو به اشخاص متفاوت تاثیرگذار است. از موارد منع مصرف کپسول اورسوداکسی کولیک اسید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- حساسیت داشتن به کپسول اوراکسی کولیک اسید و یا فرمولاسیون آن
- وجود سنگ‌های صفراوی کلسیمی
- انسداد مجاری صفراوی
- بیماری‌های کبدی حاد
- بارداری و شیردهی
- داشتن سنگ مثانه

تداخلات دارویی کپسول اورسواکسی کولیک اسید

تداخلات دارویی کپسول اورسواکسی کولیک اسید می‌تواند به طور مشهود بر اثرگذاری این دارو رویت شود. همچنین احتمال افزایش عوارض جانبی با وجود تداخلات دارویی به وجود می‌آید. این اختلالات زمانی رخ می‌دهد که فرد از داروهای دیگری استفاده می‌کند و یا رژیم خاص غذایی دارد. عملکرد قرص اورسواکسی کولیک اسید معمولاً در این مواقع مختل می‌شود. در ادامه به طور خلاصه برخی از تداخلات دارویی کپسول اورسواکسی کولیک اسید را بیان خواهیم کرد:

- کلستیرامین و کلستیپول
- داروهای کاهش‌دهنده کلسترول (استاتین‌ها)
- داروهای ضد بارداری هورمونی
- ضداسیدها
- سیکلوسپورین

عوارض جانبی کپسول اورسوداکسی کولیک اسید

عوارض جانبی کپسول اورسوداکسی کولیک اسید یکی از مهم‌ترین مواردی به شمار می‌رود که در هنگام تهیه دارو باید از آن‌ها اطلاع داشته باشید. شدت یافتن و یا حاد شدن این مشکلات می‌تواند عوارض ناخواسته‌ای را به همراه داشته باشد که با آگاهی بیشتر می‌توان این موارد را به حداقل خود رساند.

مشکلات به وجود آمده می‌توانند به صورت خفیف، متوسط و شدید باشد که به صورت عوارض گوارشی، کبدی و حساسیتی نمایان می‌شوند. ما در ادامه به برخی از عوارض جانبی کپسول اورسوداکسی کولیک اسید خواهیم پرداخت:

- عدم تعادل و سرگیجه
- دردهای عضله و کمر درد
- تحریک‌پذیری و تعریق بیش از اندازه
- عفونت مجاری تنفسی فوقانی
- حس طعمی شبیه به فلز
- عفونت ویروسی
- لوکوپنی و ترومبوسیتوپنی
- اختلالات خلق و خو مانند اضطراب و افسردگی
- تکرر ادرار و مشکل در ادرار
- ریزش مو
- راش پوستی

- مشکلات گوارشی از جمله اسهال، یبوست، سوءهاضمه و حالت تهوع، استفراغ و زخم‌های سیستم گوارش

نتیجه‌گیری

کپسول اورسوداکسی کولیک اسید ۲۵۰ میلی‌گرم، تولید شده توسط شرکت کیش مدیفارم، برای درمان و پیشگیری از بیماری‌های صفراوی و کبدی تجویز می‌گردد. این دارو با کاهش کلسترول صفرا و افزایش ترشح صفرا، سنگ‌های صفراوی را حل کرده و از تشکیل مجدد آنها جلوگیری می‌کند.

همچنین در درمان کلانریت صفراوی اولیه مفید است و علائم آن را کاهش می‌دهد. کپسول اورسوداکسی کولیک اسید ممکن است باعث تهوع، اسهال و درد شکمی شود و با داروهای کلستیرامین، استاتین‌ها، ضد اسیدها و ضد بارداری هورمونی تداخل داشته باشد. این موارد جایگزین توصیه پزشک نمی‌شود و مصرف دارو باید با نظر پزشک صورت گیرد.