



گروه دارویی کیش مدیفارم



کپسول لانزوفارم

اگر شما با مشکلات گوارشی دست و پنجه نرم کرده باشید حتما نام کپسول لانزوفارم به گوش شما خورده است، اما واقعا کپسول لانزوفارم برای چیست؟ در شرکت داروسازی کیش مدیفارم این محصول دارویی به شکل کپسول لانزوفارم تولید می‌شود اما در سراسر دنیا اشکال قرص، سوسپانسیون خوراکی و آمپول هم عرضه می‌گردد.

کپسول لانزوفارم یکی از محصولات شرکت داروسازی کیش مدیفارم است که به عنوان یک داروی مهارکننده پمپ پروتون (PPI) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو در دوزهای ۱۵ و ۳۰ میلی‌گرم و به صورت بسته‌های ۱۴ عددی تولید و عرضه می‌شود.

کپسول لانزوفارم به منظور کاهش اسید معده و درمان مشکلات مختلف گوارشی مانند زخم معده، زخم اثنی‌عشر و بیماری بازگشت اسید به مری (GERD) تجویز می‌شود. بهتر است کپسول لانزوفارم یک‌بار در روز پیش از میل صبحانه مصرف شود. از خود درمانی و یا قطع این محصول دارویی بدون مشورت پزشک اجتناب بفرمایید.

لانزوفارم در واقع نام تجاری لانسوپرازول بوده که در دسته دارویی آنتی اولسرپپتیک و کاهنده اسید معده محسوب می‌شود.

موارد مصرف لانزوفارم

کپسول لانزوفارم عمدتاً به منظور کاهش و درمان مشکلات گوارشی به افراد توسط دکتر معالج تجویز می‌گردد. پیش از استفاده لانزوفارم حتماً بروشور داخل جعبه را با دقت مطالعه بفرمایید. در ادامه به برخی از موارد مصرف کپسول لانزوفارم اشاره خواهیم کرد:

- زخم‌های ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی (NSAID)
- التهاب معده (گاستریت)
- درمان زخم‌های معده
- بهبود زخم دوازدهه
- بیماری رفلاکس معده به مری
- کاهش عفونت‌های هلیکوباکتریلوری
- بهبود سندروم زولنجر الیسون
- درمان مکمل با آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان برخی از زخم‌های معده
- زخم پپتیک (زخم معده و اثنی عشر)
- رفلاکس گاستروازوفاژیال (برگشت اسید از معده به مری)

- سوزش سر دل
- التهاب مری (ازوفازیت)

کپسول لانزوفارم به عنوان درمان کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود، با توجه به اینکه مصرف طولانی مدت کپسول لانزوفارم می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری از جمله افزایش رسک سرطان معده را به همراه داشته باشد دوره درمان را کامل طبق نظر پزشک در نظر بگیرید. این محصول دارویی ایجاد وابستگی و اعتیاد نمی‌کند.

مقدار مصرف کپسول لانزوفارم بسته به نوع بیمار و شرایط بیمار تعیین می‌گردد اما به طور کل می‌توان گفت حداکثر دوز مجاز روزانه برای بزرگسالان مبتلا به زخم‌های معده و دوازده ۳۰ میلی‌گرم در روز و برای بیماری ترشح بیش از حد اسید معده ۱۸۰ میلی‌گرم در روز توصیه می‌شود. (مصرف این دارو باید نیم تا یک ساعت قبل از صرف غذا باشد)

در صورت فراموش کردن یک دوز، به محض یادآوری دارو را مصرف کنید و چنانچه زمان بعدی مصرف نزدیک است، کپسول لانزوفارم را مطابق دوز معمول استفاده بفرمایید و از دو برابر کردن میزان آن بپرهیزید.

لانسوپرازول ممکن است با سایر آنتی‌اسیدها مصرف شود. کپسول لانزوفارم می‌تواند منجر به اختلال در برخی از نتیجه‌های تست‌های آزمایشگاهی شود.

موارد منع مصرف کپسول لانزوفارم

همان‌طور که پیش‌تر اعلام کرده‌ایم لانزوفارم به منظور کاهش علائم ناشی از اختلالات گوارشی توسط پزشک تجویز می‌گردد اما این محصول دارویی برای تمام افراد مناسب نیست.

تداخلات دارویی، سن و جنسیت، شرایط سلامت روان و جسم می‌تواند از عواملی باشد که داروها برای برخی از اشخاص منع مصرف ایجاد می‌کنند. از عمده موارد منع مصرف کپسول لانزوفارم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- داشتن حساسیت به کپسول لانزوفارم و یا تمام اجزای سازنده این محصول دارویی
- افراد زیر ۱۲ سال
- بارداری و شیردهی
- عدم تعادل الکترولیتی
- پوکی استخوان
- فنیل کتونوری
- نقص عملکرد کبدی

- حساسیت به داروهای دیگر مشابه لانزوفارم از دسته مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPIs)
- بیماران مبتلا و یا مشکوک به سرطان معده
- مشکلات کبدی و کلیوی حاد
- کمبود منیزیم
- لوپوس
- اسهال

تداخلات دارویی کپسول لانزوفارم

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت که باید به آن توجه کرد تداخلات دارویی بوده، بنابراین بهتر است پیش از استفاده دارو لیست کاملی از مکمل‌های گیاهی و غذایی، رژیم غذایی و داروهای دیگری که در حال مصرف آن‌ها هستید تهیه بفرمایید و در اختیار پزشک خود قرار دهید.

از عمده‌ترین تداخلات دارویی کپسول لانزوفارم مصرف موارد زیر هستند:

- مصرف همزمان داروهای ضد قارچ مثل کتوکونازول با کپسول لانزوفارم می‌تواند کاهش جذب این محصول را به همراه داشته باشد.
- کپسول لانزوفارم در صورتی که به طور همزمان با داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین میل شوند می‌تواند افزایش خطر خونریزی را در بر داشته باشد.
- داروهایی مثل آتازاناویر که ضد HIV به شمار می‌روند در صورتی که با کپسول لانزوفارم استفاده شوند با توجه به دلیل تغییر Ph عده سبب کاهش اثربخشی این داروها شود.

عوارض جانبی کپسول لانزوفارم

مانند هر داروی دیگری کپسول لانزوفارم می‌تواند عوارض جانبی در برداشته باشد. در صورتی که پس از مصرف لانزوفارم علائم آن تشدید شد حتماً فوراً به پزشک متخصص مراجعه کنید.

عوارض جانبی می‌تواند به علت تداخلات دارویی، مصرف بیش از اندازه و یا کم‌تر از میزان توصیه شده پزشک، واکنش‌های حساسیتی، تغییرات در متابولیسم داروها، اثر مستقیم داروها بر سیستم‌های بدن و تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای رخ دهد. در ادامه به ذکر برخی از عوارض جانبی کپسول لانزوفارم خواهیم پرداخت:

- حالت تهوع و استفراغ
- عدم تعادل و سرگیجه

- بثورات پوستی مانند راش و خارش
- درد مفاصل و عضلات
- بی میلی شدید و کاهش اشتها
- مشکلات گوارشی از جمله اسهال و یبوست
- سندروم شبه آنفولانزا
- افزایش سرفه
- دپرسیون مغزی
- ترومبوسیتوپنی
- کولیت اولسراتیو
- عفونت و یا التهاب دستگاه تنفسی فوقانی
- درد در ناحیه شکم
- خستگی و بی حالی
- آریتمی و یا ضربان قلب نامنظم
- التهاب کبد

نتیجه گیری

کپسول لانزوفارم به منظور بهبود علائم ناشی از مشکلات گوارشی بوجود می آید توسط متخصص تجویز می گردد. این محصول دارویی با قیمت مناسب در داروخانه های سراسر کشور با نسخه پزشک قابل خریداری است.

توجه به نکات مهم داروها از جمله موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و عوارض جانبی از مهم ترین مواردی به شمار می روند که پیش از مصرف باید به آنها توجه لازم را داشت.

لانزوفارم یک داروی موثر در درمان اختلالات گوارشی مانند زخم های معده و مری، رفلاکس اسید و سوزش سر دل محسوب می شود، این دارو با مهار ترشح اسید معده، علائم ناشی از افزایش اسیدیت را کاهش می دهد.

کپسول لانزوفارم در شرکت داروسازی کیش مدیفارم در دوزهای ۱۵ میلی گرم و ۳۰ میلی گرم و در بلیستر ۱۴ عددی تولید می شود. میزان، زمان و نحوه استفاده از لانزوفارم کاملاً به تشخیص پزشک متخصص بوده و به هیچ عنوان نباید خودسرانه آن را مصرف کرد و یا اینکه به طور ناگهانی استفاده از کپسول لانزوفارم را قطع کرد.

لازم به ذکر بوده تمام موارد مذکور برای افزایش آگاهی جامعه و آشنایی بیشتر با کپسول لانزوفارم تولید شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده و قطعاً جایگزین توصیه های پزشک معالج شما نخواهد شد. در صورتی که این

محصول دارویی به شما تجویز شده به هیچ عنوان آن را به شخص دیگری
توصیه نفرمایید.

Kishmedipharma