



گروه دارویی کیش مدیفارم



کپسول مایکومیس

شرکت داروسازی کیش مدیفارم که یکی از سرآمدترین تولیدکننده‌های محصولات دارویی به حساب می‌آید در حوزه‌های متفاوت مانند داروهای جنسی، گوارشی، قلبی عروقی، دیابت و مسکن درد به تولید انواع دارو می‌پردازد.

یکی از بهترین محصولات این شرکت داروسازی که مورد استقبال بسیاری از متخصصین قرار گرفته کپسول مایکومیس بوده که نام ژنریک آن ایتراکونازول است. اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که کپسول ایتراکونازول برای چیست؟ تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

در سراسر جهان ایتراکونازول به اشکال متفاوت از جمله قرص ایتراکونازول، کپسول، محلول خوراکی، محلول تزریقی و فرم‌های موضعی از جمله کرم، ژل یا پماد تولید می‌شوند. قرص ایتراکونازول، کپسول و یا مدل موضعی این محصول دارویی با توجه به شرایط بیمار و تشخیص پزشک انتخاب می‌شود.

در ادامه به توضیح کاملی در مورد این محصول خواهیم پرداخت فقط باید دقت داشت با توجه به اینکه ایتراکونازول به صورت قرص ایتراکونازول و کپسول مایکومیس شناخته می‌شود از نام‌های جایگزین استفاده می‌کنیم.

موارد مصرف کپسول مایکومیس

در بین عموم ایتراکونازول برای عفونت واژن شناخته شده اما این محصول دارویی به منظور درمان و بهبود عفونت‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کل می‌توان گفت قرص ایتراکونازول با نفوذ درون ساختار سلولی قارچ‌ها اجازه رشد و تکثیر بیشتر را به آن‌ها نمی‌دهد. قرص ایتراکونازول از دستگاه گوارش جذب، از کبد متابولیزه و از ادرار و مدفوع دفع می‌گردد.

قرص ایتراکونازول به منظور درمان عفونت‌های قارچی پوست، عفونت‌های قارچی دهان و گلو، ایتراکونازول برای عفونت واژن و عفونت‌های قارچی سیستمیک توسط پزشک متخصص تجویز می‌شود.

اگر هنوز هم برای شما این سوال وجود دارد که کپسول ایتراکونازول برای چیست در ادامه به ذکر برخی از موارد مصرف کپسول مایکومیس را نام خواهیم برد:

- آسپرژیلوز
- بلاستومایکوز

- کاندیدیاز مری و حلقی- دهانی
- کاندیدیاز جلدی مخاطی مزمن و مهبلی
- کرومو میکوز
- کوکسید یوما میکوز
- هیستو پلاسماز
- تب نوتروپنی
- انیکو مایکوز
- پاراکوکسیدیوئید میکوز
- مننژیت کریپتو کوکی
- عفونت های قارچی اطراف ناخن (دست یا پا)
- عفونت پنیسیلیوم
- پنومونی قارچی
- سپتی سمی قارچی
- اسپوروتریکوز منتشره
- کچلی بدن، کشاله ران و پا

نکات مهمی درباره مصرف قرص ایتراکونازول

اگرچه مصرف کپسول مایکومیس به ظاهر ساده می آید اما عدم رعایت همین نکات می تواند مشکلات جبران ناپذیری را در بر داشته باشد. ما در ادامه سعی کرده ایم مهم ترین نکات درباره قرص ایتراکونازول را توضیح دهیم:

- کپسول مایکومیس را به همراه یک لیوان پر از آب میل بفرمایید.
- از شکستن، حل کردن در مایعات، له و خوردن کپسول مایکومیس و قرص ایتراکونازول خودداری کنید. (تا نیم ساعت پس از مصرف از دراز کشیدن و خوابیدن پرهیز شود).
- برای جذب بهتر قرص ایتراکونازول همراه با وعده غذایی مصرف شود.
- در صورت تشدید تمام علائم و عوارض پس از استفاده قرص ایتراکونازول فوراً باید به پزشک متخصص و یا اورژانس مراجعه بفرمایید.
- در صورتی که قصد بارداری دارید، باردار و یا شیرده هستید تمام محصولات دارویی از جمله کپسول مایکومیس، انواع مکمل ورزشی، غذایی و گیاهی را با مشورت پزشک معالج و تحت نظر ایشان استفاده نمایید. قرص ایتراکونازول در این دوران می تواند آسیب جدی به جنین وارد کند.
- قرص ایتراکونازول و کپسول مایکومیس، هر دو حاوی ماده موثره ایتراکونازول هستند، اما با نام های تجاری متفاوت ارائه می شوند به دلیل

اثرات ضد قارچی خود ایتراکونازول برای عفونت واژن ناشی از کاندیدا می‌تواند مؤثر باشند. میزان و نحوه مصرف کپسول مایکومیس برعهده پزشک معالج است.

- پس از منقضی شدن کپسول مایکومیس را به روش صحیح از بین ببرید.
- از توصیه این محصول دارویی به افراد دیگر خودداری بفرمایید چرا که قرص ایتراکونازول فقط برای شرایط فعلی مصرف‌کننده تجویز می‌گردد.
- الکل می‌تواند بر روی جذب و متابولیسم قرص ایتراکونازول تاثیر بگذارد. مصرف الکل ممکن است باعث افزایش بار کبدی شود و توانایی کبد در متابولیسم قرص ایتراکونازول را کاهش دهد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش سطح خونی دارو و افزایش خطر بروز عوارض جانبی شود. همچنین، الکل می‌تواند عوارض جانبی کپسول مایکومیس را تشدید کند و باعث ناراحتی‌های گوارشی، سردرد، سرگیجه و سایر مشکلات شود.

موارد منع مصرف کپسول مایکومیس

همان‌طور که گفته شد ایتراکونازول برای عفونت واژن مورد استفاده قرار می‌گیرد اما باید به یاد داشته باشید مصرف هر دارو می‌تواند براساس عوامل متعددی از جمله سن، شرایط جسمانی فرد، شدت و نوع بیماری متفاوت باشد.

کپسول مایکومیس نیز برای تمام افراد مناسب نیست بنابراین برای به حداقل رساندن مشکلات ناخواسته پس از مصرف دارو نیاز است به موارد منع مصرف قرص ایتراکونازول و یا کپسول مایکومیس نهایت دقت را داشت. در ادامه به ذکر برخی از مهم‌ترین این موارد خواهیم پرداخت:

- داشتن حساسیت به قرص ایتراکونازول (کپسول مایکومیس) و فرمولاسیون تشکیل‌دهنده آن
- بارداری و شیردهی
- نارسایی و مشکلات حاد کبدی و کلیوی
- افراد زیر ۱۲ سال
- مصرف همزمان با برخی از داروها (تداخلات دارویی)

تداخلات دارویی کپسول مایکومیس

از مهم‌ترین نکاتی که در هنگام مراجعه به پزشک باید متذکر شوید لیست داروهای مصرفی شما به شمار می‌رود. پیش از مراجعه به دکتر از تمام محصولات گیاهی و دارویی که استفاده می‌کنید جدولی تهیه کنید و در اختیار پزشک خود قرار دهید.

دکتر متخصص با بررسی و پایش شرایط فرد و نکات دیگر که می‌تواند شامل داروهای مصرفی باشد، بهترین راه‌های درمان را تجویز می‌کند.

تداخلات دارویی کپسول مایکومیس می‌تواند سبب بروز مشکلات و عوارض خطرناک شود و بر شدت اثرگذاری داروها تاثیر بگذارد. از بارزترین تداخلات دارویی کپسول مایکومیس یا قرص ایتراکونازول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مصرف همزمان داروهای ضد اسید با کپسول مایکومیس جذب ایتراکونازول را کاهش دهد.
- استفاده وارفارین و قرص ایتراکونازول به طور همزمان خطر خونریزی را افزایش دهد.
- سطح خونی ایتراکونازول در صورت استفاده همزمان با کپسول مایکومیس افزایش می‌یابد.
- مصرف همزمان کپسول مایکومیس با ریتوویر احتمال دارد سطح خونی ایتراکونازول را افزایش دهد.

به یاد داشته باشید که قرص ایتراکونازول می‌تواند با برخی داروها مانند ریفامپین، کاربامازپین، فنیتوئین، پیموزاید، ترکیبات آزل و دیگر و برخی داروهای قلبی عروقی تداخل داشته باشد و باید در مصرف همزمان این داروها با پزشک مشورت شود

عوارض جانبی قرص ایتراکونازول

عوارض جانبی شایع کپسول مایکومیس شامل سردرد و سرگیجه، بی‌حسی و احساس سوزش در اندام‌ها، بی‌خوابی و مشکل در خواب، احساس طعم فلز در دهان، تهوع، اسهال، درد شکم، ضعف و خستگی، تغییر در رنگ ادرار، بثورات پوستی و افزایش آنزیم‌های کبدی است.

در موارد نادر می‌تواند منجر به اختلالات خونی، افسردگی و اضطراب شود. عوارض جانبی قرص ایتراکونازول می‌تواند خفیف، متوسط و شدید باشد بنابراین باید حتماً به این موارد نهایت دقت را داشت و در صورت بروز این مشکلات به صورت حاد فوراً به پزشک متخصص مراجعه کرد.

عوارض جانبی قرص ایتراکونازول می‌تواند به علل مختلفی از جمله بیماری‌های زمینه‌ای، عوامل محیطی، سن و جنسیت، تداخلات دارویی، حساسیت‌ها و عدم مصرف صحیح دوز دارو متفاوت باشد.

نتیجه‌گیری

در افکار عمومی ایتراکونازول برای عفونت واژن فقط در نظر گرفته می‌شود اما باید گفت این محصول دارویی علاوه بر درمان عفونت واژن به منظور بهبود و کنترل اختلالات دیگر ناشی از برخی عفونت‌ها نیز تجویز می‌گردد.

شرکت داروسازی کیش مدیفارم که بالغ بر ۲۴۰ محصول دارویی، آرایشی بهداشتی، پروبیوتیک، مکمل ورزشی و غذایی تولید کرده با عرضه کپسول مایکومیس که نام ژنریک آن ایتراکونازول بوده مورد توجه بسیاری از متخصصین قرار گرفته است.

کپسول مایکومیس با دوز ۱۰۰ میلی‌گرم در بسته‌های ۳۰ عددی در داروخانه‌های کشور با قیمت مقرون‌به‌صرفه قابل خریداری است. قرص ایتراکونازول با مکانیسم عمل خوبی که دارد از ایجاد رشد و انتشار عفونت‌های قارچی جلوگیری می‌کند.

لازم به ذکر است تمام مطالب مذکور جهت بالا بردن آگاهی افراد جامعه بوده و قطعاً با این اطلاعات نباید به صورت خودسرانه از قرص ایتراکونازول استفاده کرد. پزشک متخصص با رصد شرایط فرد و انجام آزمایشات بهترین روش درمان را توصیه می‌نماید.