

گروه دارویی کیش مدیفارم

کپسول مبماکس

شرکت داروسازی کیش مدیفارم، یکی از پیشروان صنعت داروسازی در ایران به شمار می‌آید که محصولات متنوعی را در زمینه‌های مختلف تولید و عرضه می‌کند. یکی از محصولات این شرکت، کپسول مبماکس محسوب می‌گردد که در دوز ۲۰۰ میلی گرم تولید می‌شود.

کپسول مبماکس با نام ژنریک مبورین در دسته داروهای گوارشی قرار گرفته و به عنوان یک درمان طبیعی و موثر برای بهبود سلامت دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کپسول مبماکس حاوی ترکیبات گیاهی و طبیعی است که برای درمان مشکلات گوارشی مانند نفخ، درد شکم، یبوست و اسهال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول به طور خاص برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن طراحی شده است.

مکانیسم عمل کپسول مبماکس به صورتی بوده که به بهبود گردش خون در دستگاه گوارش، بهبود هضم غذا و جذب مواد مغذی کمک می‌کند.

موارد مصرف کپسول مبماکس

همان‌طور که گفته شد کپسول مبماکس با دوز ۲۰۰ میلی‌گرم تولید شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که با توجه به کارایی و مکانیسم عمل خوبی که دارد مورد توجه بسیاری از متخصصین گوارش قرار گرفته است.

این محصول دارویی به طور کل به منظور کاهش و بهبود دردهای شکمی توسط پزشک معالج تجویز می‌گردد. در ادامه به ذکر مهم‌ترین موارد مصرف کپسول مبماکس خواهیم پرداخت:

- نفخ و تورم شکم (کاهش گازهای اضافه در معده و روده)

- درد شکم و سوزش معده (کاهش اسید معده)

- یبوست و اسهال

- زخم‌های دستگاه گوارش

- کاهش اشتها و عدم تحمل غذایی

- تخریب میکروبیوم روده

- کمبود آنزیم‌های گوارشی

- درمان نوروپاتی چند گانه

- سوء هاضمه (بهبود فرآیند هضم غذا)
- زخم دوازدهه (مکمل درمانی برای کاهش التهاب)
- بهبود عملکرد شناختی در برخی اختلالات نورولوژیک
- درمان بیماری های التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرون

نکاتی مهم درباره مصرف کپسول مبماکس

یکی از توصیه‌هایی که همیشه در هنگام خرید محصولات دارویی به شما داریم، نگهداشتن جعبه‌های داروها و بروشورهای داخل آن است. احتمال دارو بسیاری از شما در قفسه داروخانه منزل داروهایی داشته باشید که تاریخ انقضا آن‌ها گذشته باشد و یا فراموش کرده باشید دقیقاً کارآیی و نکات مهم این دارو کدامند.

رعایت نکات به ظاهر ساده در حین مصرف کپسول مبماکس به شدت در درمان مشکلات گوارشی تاثیرگذار بوده و می‌تواند از مشکلات احتمالی جلوگیری نماید. در ادامه به ذکر برخی از نکات مهم درباره مصرف کپسول مبماکس خواهیم پرداخت:

- ازجویدن، له کردن، شکستن و یا خورد کردن کپسول مبماکس جلوگیری نمایید، همچنین این کپسول نباید در مایعات پیش از مصرف حل شود.
- پس از زمان انقضا، کپسول مبماکس را به طور صحیح با مشورت دکتر داروساز امحا کنید.
- کپسول مبماکس باید در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.
- در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری کپسول مبماکس را میل بفرمایید و اگر نزدیک به دوز بعدی هستید آن را رها کنید و در زمان مقرر به روتین خود بازگردید. از استفاده دو دوز و دو برابر کردن کپسول مبماکس جدا خودداری فرمایید.
- به هیچ عنوان خوددرمانی نفرمایید. از مصرف خودسرانه و قطع ناگهانی کپسول مبماکس جلوگیری کنید.
- کپسول مبماکس به منظور درمان مشکلات گوارشی از جمله هضم بهتر غذا، کاهش اسید معده، بهبود دردهای شکمی و ... توسط پزشک تجویز می‌گردد و برای درمان اختلالات حادتر از جمله سرطان معده درمان‌های تخصصی‌تری در نظر گرفته می‌شود.
- طول دوره درمان با کپسول مبماکس برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت بوده چرا که زمان درمان براساس عوامل متعددی از جمله شدت

بیماری تجویز می‌شود و ممکن است برای اختلالات ساده مانند اسهال و نفخ برای ۲ الی ۳ هفته توصیه گردد و برای مشکلات حادتر از جمله یبوست مصرف کپسول مبماکس به مدت ۲ الی ۳ ماه پیشنهاد شود.

- سرعت اثرگذاری کپسول مبماکس معمولاً سریع بوده چرا که از طریق دستگاه گوارش جذب خون شده، توسط کبد متابولیزه می‌گردد و از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود. بنابراین نیاز نیست کپسول مبماکس را چندین بار مصرف نمایید و بهتر است به میزان و نحوه استفاده‌ای که متخصص توصیه کرده پایبند بمانید. عموماً توصیه می‌شود روزانه ۱ تا ۳ کپسول مبماکس مصرف شود.
- به منظور جذب بهتر کپسول مبماکس آن را همراه با غذا و یا کمی پس از وعده غذایی میل نمایید.
- با توجه به اینکه دوران بارداری و شیردهی بسیار زمان حساسی به حساب می‌آید استفاده از تمامی داروها از جمله کپسول مبماکس، مکمل‌های غذایی و گیاهی باید زیر نظر دکتر معالج شخص انجام شود.
- کپسول مبماکس باید با یک لیوان پر از آب میل شود تا به راحتی از مری و معده عبور کند.
- برای حفظ میزان دارو در سطح خون، بهتر بوده کپسول مبماکس در یک زمان مشخص از روز میل شود.
- به محض تشدید علائم و عوارض جانبی پس از مصرف کپسول مبماکس سریعاً به اورژانس مراجعه بفرمایید.
- کپسول مبماکس ایجاد وابستگی و اعتیاد نمی‌کند اما باید به همان دوره درمان توصیه شده پایبند بود و بیش‌تر از طول دوره درمان مصرف نشود.
- اگرچه کپسول مبماکس خواب‌آلودگی به همراه ندارد اما برخی از افراد دچار سرگیجه می‌شوند که در این زمان باید از فعالیت‌هایی که نیاز به تمرکز و تعادل دارد از جمله رانندگی، مطالعه و کار با ماشین‌آلات سنگین را به تعویق بیاورند.

موارد منع مصرف کپسول مبماکس

از دیگر نکات حائز اهمیت در زمان استفاده از محصولات دارویی توجه به موارد منع مصرف آن‌ها به شمار می‌رود. اگرچه محصولات دارویی به منظور پیشگیری، بهبود و درمان اختلالات تولید می‌گردند اما برای تمام افراد مناسب نیستند و احتمال دارد برای برخی از افراد مشکلاتی را در بر داشته باشند.

کپسول مبماکس نیز موارد منع مصرفی دارد که در ادامه به ذکر مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت:

- داشتن حساسیت به کپسول مېماکس و فرمولاسیون آن
- افراد زیر ۱۲ سال
- خانم‌ها باردار و شیرده (مصرف فقط با توصیه پزشک)
- افراد مبتلا به مشکلات کبدی و کلیوی حاد
- افراد الکلیسم
- اشخاص مبتلا به اختلالات قلبی عروقی

تداخلات دارویی کپسول مېماکس

همان‌طور که گفته شد کپسول مېماکس توسط پزشک با صلاحیت ایشان تجویز می‌گردد بنابراین بهتر بوده پیش از مراجعه به دکتر حتما لیست کاملی از مکمل‌های غذایی، مکمل‌های گیاهی و داروهایی که مصرف می‌کنید تهیه بفرمایید و در اختیار ایشان قرار دهید.

پزشک متخصص با پایش شرایط فرد، جنسیت، سن، داروهای مصرفی، شدت و نوع بیماری راه‌های درمان را توصیه می‌نماید.

کپسول مېماکس نیز باید با رصد کامل شرایط فرد تجویز گردد چرا که ممکن است تداخلات دارویی ایجاد کند و سبب شدت یافتن عوارض جانبی، کاهش و یا افزایش اثرگذاری داروها شود. از تداخلات دارویی کپسول مېماکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- استفاده کپسول مېماکس با آنتی‌اسیدها اثر بخشی دارو را کاهش دهد.
- در صورتی که کپسول مېماکس همزمان با وارفارین استفاده گردد خطر خونریزی افزایش پیدا می‌کند.
- مصرف همزمان این محصول دارویی با سایمتیدین ممکن است سطح خونی مېماکس را افزایش دهد.
- اگر کپسول مېماکس با دیگوکسین به طور همزمان مصرف شود احتمال دارد سطح خونی دیگوکسین را افزایش دهد.

همچنین داروهای ضدانعقاد خون، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، داروهای ضداسید معده و داروهای ضد افسردگی در شرایطی که با کپسول مېماکس استفاده شوند می‌توانند سبب بروز تداخلات دارویی شود.

عوارض جانبی کپسول مېماکس

داروها به منظور کمک به سلامت بشر تولید می‌شوند اما در مواردی برای تمام افراد مناسب نیستند، تداخلات دارویی ایجاد می‌کنند و یا فرد با مصرف دوز نامناسب (مصرف بیش از اندازه توصیه شده و یا کمتر از آن) مشکلات دیگری را تجربه می‌کند.

بهتر است به منظور کاهش عوارض جانبی کپسول مېماکس تمام نکات مذکور تا به الان را رعایت فرمایید. در ادامه به طور خلاصه برخی از عوارض جانبی کپسول مېماکس را نام خواهیم برد:

- سردرد و سرگیجه
- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
- خستگی و ضعف شدید
- افزایش فشار خون
- مشکل در ادرار و عفونت‌های ادراری
- کم‌خونی
- تغییر در خلق و خو (اضطراب و افسردگی)
- احساس گرما در بدن و تعریق بیش از اندازه
- بی‌خوابی و اختلال در خواب
- حالت تهوع و اسهال
- واکنش‌های آلرژیک و بثورات پوستی مانند خارش، کهیر، ورم صورت یا زبان، دشواری در تنفس

عوارض جانبی کپسول مېماکس می‌تواند خفیف، متوسط و شدید باشد که در صورت تشدید هرکدام از علائم باید فوراً پزشک متخصص خود را در جریان قرار دهید و یا به اورژانس مراجعه نمایید.

نتیجه‌گیری

کپسول مېبورین با نام تجاری کپسول مېماکس یکی از محصولات تولید شده در شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که در دوز ۲۰۰ میلی‌گرم و بسته‌های ۳۰ عددی عرضه می‌گردد.

مکانیسم عمل کپسول مېماکس به طوری بوده که به منظور درمان و بهبود مشکلات گوارشی از جمله دردهای شکمی، نفخ و سوء هاضمه، یبوست و اسهال، کاهش اشتها و بی‌میلی تشدید توسط پزشک متخصص توصیه می‌شود. این محصول دارویی با قیمت قرون‌به‌صرفه در داروخانه‌های سراسر کشور قابل خرید و تهیه است.

توجه به موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و عوارض جانبی مذکور می‌تواند فرد را در روند درمان با کپسول مېماکس کمک کند و از عوارض جانبی و مشکلات ناخواسته جلوگیری کند و آن‌ها را به حداقل ممکن برساند.

به یاد داشته باشید تمام مطالب مذکور به علت مسئولیت اجتماعی که افزایش سطح آگاهی جامعه است نوشته شده و به هیچ عنوان نباید فقط به این موارد

اکتفا کرد. در این محتوا صرفا کپسول مپماکس کیش مدیفارم و عملکرد آن معرفی شده و قطعا نباید به طور خودسرانه از آن استفاده کرد. هیچ مطلبی قطعا جایگزین تشخیص پزشک معالج که با پایش و رصد شرایط فرد دارو درمانی را توصیه می‌کند، نخواهد شد.

Kishmedipharma