

گروه دارویی کیش مدیفارم

کپسول مپرازون

شرکت داروسازی کیش مدیفارم، یکی از شرکت‌های برجسته در زمینه تولید داروهای با کیفیت، محصولی به نام کپسول مپرازون با نام ژنریک امپرازول بوده (Omeprazol) را تولید می‌کند.

این محصول دارویی که در دسته دارویی گوارشی قرار دارد، به عنوان یک مهارکننده پمپ پروتون (PPI) شناخته می‌شود و برای درمان مشکلات مرتبط با اسید معده به کار می‌رود. امپرازول در دوز ۲۰ میلی‌گرم و به صورت بسته‌های ۱۴ عددی تولید و عرضه می‌شود.

موارد مصرف کپسول مپرازون

همان‌طور که گفته شد کپسول مپرازون یکی از انواع داروهای تولید شده در دسته گوارش شرکت داروسازی کیش مدیفارم بوده که مورد توجه متخصصین بسیاری قرار گرفته است. در ادامه به ذکر برخی از موارد مصرف کپسول مپرازون به طور خلاصه خواهیم پرداخت:

- درمان زخم‌های معده و اثنی عشر
- بهبود رفلکس معده (برگشت اسید معده)
- تسکین سوء هاضمه
- کاهش سندرم زولینگر-الیسون
- بهبود زخم دوازدهه
- بهبود ریفلاکس معده-مری (GERD)
- پیشگیری از ایجاد زخم‌های گوارشی در افراد مستعد به این بیماری (افرادى که طولانى مدت داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی مصرف می‌کردند)
- میزان دوز مصرفی کپسول مپرازول به تشخیص پزشک معالج اعلام می‌شود، ضمن اینکه دوره‌های درمان این محصول دارویی معمولاً بین ۴ هفته الی ۸ هفته است.
- برای جذب بهتر کپسول مپرازول باید در صورت صلاحدید دکتر متخصص باید ناشتا و پیش از صبحانه میل شود.
- جذب کپسول مپرازون از طریق دستگاه گوارش به سرعت بوده و معمولاً تا ۲۴ ساعت اثرگذاری دارد، متابولیزه آن از طریق کبد و دفع کپسول مپرازون به وسیله ادرار یا مدفوع انجام می‌شود.
- کپسول مپرازون را برای جذب بهتر با یک لیوان پر از آب میل بفرمایید. از قطع خودسرانه و یا خود درمانی به وسیله کپسول مپرازون خودداری نمایید.

- کپسول مپرازون باید به دور از نور خورشید و در دمای کم‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- مصرف طولانی‌مدت کپسول امپرازول ممکن است باعث کاهش جذب مواد مغذی مانند ویتامین B12 و منیزیم شود. در این موارد، پزشک ممکن است مکمل‌های تغذیه‌ای توصیه کند.
- کپسول مپرازون ایجاد وابستگی و اعتیاد نمی‌کند اما باید همان طول درمان توصیه شده متخصص طی شود و از مصرف بیش از اندازه این محصول دارویی خودداری کنید.

موارد منع مصرف کپسول مپرازون

اگرچه داروها به منظور بهبود، پیشگیری و درمان افراد جامعه تولید می‌شوند اما برای تمام اشخاص ممکن است مناسب نباشند. دوران بارداری و شیردهی از حساس‌ترین زمان‌های زندگی افراد بوده و قطعا در این بازه زمانی باید تمام محصولات دارویی، گیاهی و غذایی که استفاده می‌کنند تحت نظر پزشک معالج باشد.

در صورتی که کپسول مپرازون برای فرد مناسب نباشد می‌تواند مشکلات ناخواسته‌ای به وجود آورد، بنابراین بهتر است پیش از مصرف موارد منع مصرف کپسول مپرازون را به خوبی بشناسید. در ادامه به ذکر برخی از این موارد می‌پردازیم:

- افراد الکلیسم (اعتیاد به الکل)
- خانم‌های باردار (تحت نظر پزشک)
- اشخاصی دارای کم‌خونی پرنیشیوز
- افراد مبتلا به سیروز کبدی
- خانم‌های شیرده (تحت نظر پزشک)
- حساسیت داشتن به کپسول مپرازون و فرمولاسیون تشکیل‌دهنده آن
- اشخاص مبتلا به مشکلات و نارسایی‌های کلیوی

تداخلات دارویی کپسول مپرازون

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در هنگام مراجعه به پزشک متخصص باید به ایشان یادآور شوید، لیست کاملی از داروهایی که در حال مصرف آن‌ها هستید، مکمل‌های غذایی و گیاهی شما بوده که می‌تواند کمک به‌سزایی به پزشک معالج داشته باشد.

ما در ادامه به ذکر برخی از تداخلات دارویی کپسول مپرازون خواهیم پرداخت:

- مصرف همزمان کپسول مپرازون با داروهای ضد انعقان خون مانند وارفارین افزایش خطر خونریزی را به همراه دارد.
- ریسک افزایش سطح دیگلوکسین در خون با استفاده همزمان این دارو و کپسول مپرازون امکان پذیر است.
- مصرف همزمان کپسول مپرازون و الکل سبب بروز مشکلات گوارشی می شود.
- در صورت استفاده کلوپیدوگرل و کپسول مپرازون کاهش اثر ضدپلاکتی کلوپیدوگرل محتمل تر می گردد.
- میزان جذب آنتی بیوتیک ها مانند کلاریترومایسین با مصرف همزمان کپسول مپرازون تغییر می یابد.
- همچنین داروهای ضد تشنج (فنی توئین)، داروهای ضدایدز (اتازاناویر) و داروهای ضدقارچ (کتوکونازول و ایتراکونازول) می توانند با کپسول مپرازون تداخل های دارویی ایجاد کنند.

عوارض جانبی کپسول مپرازون

عوارض جانبی داروهای می توانند براساس شدت آن ها خفیف، متوسط و شدید طبقه بندی شوند که در صورت حاد شدن هر عارضه پس از مصرف داروها، فرد باید فوراً به اورژانس و پزشک معالج خود مراجعه نماید. در ادامه به ذکر برخی از عوارض جانبی کپسول مپرازون خواهیم پرداخت:

- سردرد و سر گیجه
 - دردهای ناحیه معده و شکم
 - کاهش سطح منیزیم خون
 - مشکلات کبدی
 - واکنش های آلرژیک شدید
 - اختلالات خونی
 - مشکلات گوارشی از جمله تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال و نفخ
- عوارض جانبی کپسول مپرازون می تواند به یکی از دلایل دوز مصرفی، طول درمان، تداخلات دارویی، نحوه مصرف، عوامل ژنتیکی و حساسیت های فرد رخ دهد. در کل احتمال دارد برخی افراد بیشتر مستعد این مشکلات ناخواسته باشند.

نتیجه گیری

همان طور که اعلام کردیم کپسول مپرازون یک مهارکننده پمپ پروتون به شمار می آید که توسط شرکت داروسازی کیش مدیفارم در دوز ۲۰ میلی گرم

و بسته‌های ۱۴ عددی تولید و عرضه می‌گردد. این محصول دارویی فقط به تشخیص پزشک متخصص و با نسخه به منظور کاهش و بهبود دردهای دستگاه گوارشی از جمله زخم معده، زخم دوازدهه، سندرم زولینگر الیسون ریفلکس معده و ... توصیه می‌شود.

مکانیسم عمل کپسول مپرازون به صورتی بوده که با کاهش ترشح اسید معده به درمان مشکلات مرتبط با اسید معده کمک می‌کند. این محصول دارویی خواب‌آور نبوده اما در صورتی که فرد مصرف‌کننده دچار سرگیجه شد باید از انجام مواردی مانند رانندگی، مطالعه و کار با ماشین‌آلات که نیازمند تعادل و تمرکز بالا است اجتناب نماید.

به خاطر داشته باشید، تمام موارد اعلام شده به منظور معرفی کپسول مپرازون کیش مدیفارم است و به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین توصیه‌های پزشک معالج شما شود. دکتر متخصص با رصد و پایش شرایط فرد مراجعه‌کننده بهترین روش درمان را به ایشان اعلام می‌کند.