

گروه دارویی کیش مدیفارم

کپسول نکسیفارم

اس امپرازول یک داروی خوراکی و از پرکاربردترین داروها در دسته مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPIs) به شمار می‌آید که برای درمان مشکلات گوارشی مرتبط با اسید معده توسط پزشک متخصص توصیه و تجویز می‌شود.

این محصول دارویی که با کاهش تولید اسید معده، به بهبود علائم بیماری‌های گوارشی کمک می‌کند در شرکت داروسازی کیش مدیفارم با نام نکسیفارم عرضه شده است. اس امپرازول برای اولین بار با نام قرص نکسیوم در شرکت داروسازی آسترازنکا در سال ۲۰۰۱ تولید شده است.

موارد مصرف و مکانیزم عمل اس امپرازول

همان‌طور که گفته شد داروی اس امپرازول یک مهارکننده پمپ پروتون (PPI) محسوب می‌شود که پمپ‌های پروتون سلول‌های معده، اسید معده را تولید می‌کنند. اس امپرازول با متصل شدن به این پمپ‌ها، آن‌ها را غیرفعال می‌نماید و در نتیجه ترشح اسید معده را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

از آنجایی که اس امپرازول یک راه‌کار درمانی به منظور بهبود مشکلات گوارشی محسوب می‌شود، متخصصین برای درمان و کنترل موارد متفاوتی آن را تجویز می‌کنند. در ادامه به ذکر برخی از موارد مصرف نکسیفارم پرداخته‌ایم:

- پیشگیری و درمان زخم‌های وابسته به مصرف داروهایی مانند داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی
- درمان و بهبود مشکلات به وجود آمده بر اثر سوزش معده و سوء هاضمه ناشی از اسید معده
- بیماری رفلاکس معده به مری رفلاکس گاستروازوفازیتال (GERD)
- سندرم زولینگر-الیسون (Zollinger-Ellison syndrome)
- کاهش خطر خونریزی گوارشی در بیماران بحرانی
- درمان زخم‌های خوش خیم معده و دوازدهه
- کاهش اسید معده قبل از عمل‌های جراحی
- بهبود التهاب مری ناشی از پرتودرمانی
- درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری
- درمان زخم معده و اثنی عشر
- سندرم بارت

انواع اس امپرازول

داروی اس امپرازول با اشکال متفاوت از جمله قرص‌های خوراکی، کپسول خوراکی، پودر برای محلول خوراکی، قرص‌های بازدارنده رهاسازی تاخیری،

تزریق وریدی، اس امپرازول در ترکیب با سایر داروها و محلول‌های تزریقی در سراسر دنیا نیز تولید شده است و به عنوان یک مهارکننده قوی تولید اسید معده شناخته می‌شود.

در درمان بیماری‌های مختلف گوارشی که پیش‌تر اعلام گردید، به صورت تک درمانی و درمان ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تنوع در اشکال دارویی به بیمار کمک می‌کند تا فرمت مناسب خود را با مشورت پزشک متخصص انتخاب کند. انواع فرمت‌های اس امپرازول معمولاً در دوزهای ۲۰ میلی‌گرم و ۴۰ میلی‌گرم عرضه می‌گردد.

موارد منع مصرف اس امپرازول

اگرچه قرص نکسیفام به منظور درمان و بهبود بسیاری از مشکلات گوارشی تولید شده اما برای تمام افراد مناسب نیست. همان‌طور که قبلاً اعلام شد مصرف این دارو فقط با تجویز پزشک و با پایش شرایط شما امکان‌پذیر است.

به تشخیص پزشک در صورتی که اس امپرازول مناسب شما نباشد، احتمال دارد داروی جایگزینی را اعلام کند. در ادامه به برخی از شرایطی که افراد امکان مصرف اس امپرازول را ندارند به طور خلاصه اشاره کرده‌ایم:

- حساسیت و واکنش‌های شدید به اس امپرازول و مواد تشکیل‌دهنده آن، سایر مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPIs) یا داروهای مشابه
- سابقه انواع بیماری‌های گوارشی شدید مانند خونریزی فعال یا مشکل انسداد معده
- مصرف طولانی مدت بیش از ۸ هفته
- نارسایی کبدی حاد و یا شدید
- کمبود ویتامین B12
- بارداری و شیردهی
- کودکان زیر ۱ سال
- استئوپروز

تداخلات دارویی اس امپرازول

از مهم‌ترین نکاتی که قبل از مصرف هر دارو باید به آن توجه کنید، تداخلات دارویی است. مشکلات دارویی می‌توانند سبب عوارض خطرناکی شوند. مصرف هم‌زمان برخی از داروها با نکسیفام می‌تواند خطرات جذبی و متابولیکی را به همراه داشته باشد.

اس امپرازول با مهار ترشح اسید معده، بر فراهمی زیستی داروهایی که جذب وابسته به PH دارند اثرگذار است. تداخلات دارویی اس امپرازول را در ادامه به طور خلاصه بیان کرده‌ایم:

- آمپیکیل (Ampicillin) ، آنتی‌فون (Antifungal agents) ، کلپیدوگرل (Clopidogrel)، دیازپام (Diazepam) و وارفارین (Warfarin)
- داروهای ضد درد اپیوئیدی: مانند مورفین، کدئین، اکسی کدون (خط خواب‌آلودگی و مشکلات تنفسی)
- داروهای هورمونی تیروئید مانند لووتیروکسین (کاهش جذب هورمون تیروئید در بدن)
- سایر مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI) مانند لانزوپرازول، پانتوپرازول، رابپرازول
- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) (خطر خونریزی معده)
- داروهای ضد قارچی از جمله کتوکونازول، ایتراکونازول و ووریکونازول
- داروهای ضد ویروسی از جمله ریتوناویر، ایندیناویر و فوسامپیرناویر
- داروهای ضد فشار خون مانند کاپتوپریل، لیزینوپریل و آملودیپین
- گریپ فروت و آب گریپ فروت (افزایش جذب اس امپرازول)
- داروهای ضد افسردگی (SSRI) اس سیتالوپرام و سیتالوپرام
- آمپی سیلین (کاهش در اثرگذاری ضد باکتریایی این دارو)
- قرص‌های ضد بارداری (خطر افزایش میزان قند خون)
- نوشیدن الکل و مشتقات آن (افت قند خون)
- دیگو کسین (افزایش خطر آریتمی)
- داروهای درمان ایدز
- کلاری ترومیسین
- کلپیدوگرل
- ساکوئیناویر
- کیلوستازول
- فنی توئین

عوارض جانبی اس امپرازول

اس امپرازول اگرچه یکی از داروهای امن به شمار می‌آید اما می‌تواند بر اثر اشتباه در میزان دوز مصرفی، تداخلات دارویی و شرایط سلامتی فرد عوارضی را به همراه داشته باشد. از رایج‌ترین عوارض جانبی اس امپرازول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- خشکی دهان

- زردی پوست و چشم‌ها
- اختلالات کبدی (افزایش آنزیم‌های کبد)
- افزایش خطر شکستگی و پوکی استخوان
- عوارض مربوط به سیستم عضلانی و اسکلتی
- پولیپ غدد بزاقی، آسم، مشکلات و تنگی نفس
- مشکلات پوستی (راش پوستی، خارش، قرمزی، تورم و کهیر)
- عوارض سیستم عصبی مرکزی (سر درد، خستگی و سر گیجه)
- عوارض کلیوی (افزایش ریسک عفونت کلیه، اختلال در عملکرد کلیه)
- مشکلات گوارشی (حالت تهوع و استفراغ، یبوست و اسهال، دردهای شکمی)

نکات مهم درباره نکسیفارم

پس از بررسی‌های انجام شده و تحقیقاتی که به صورت میدانی از مراجعین در داروخانه‌ها داشتیم، متوجه رایج‌ترین سوالات شده‌ایم و سعی کردیم در ادامه نکات مهمی را درباره نکسیفارم بیان کنیم که از ایجاد ابهام در مورد این دارو جلوگیری نماییم:

- مدت مصرف اس امپرازول به نوع بیماری و شدت آن بستگی دارد. مصرف نکسیفارم معمولاً حداقل ۴ تا ۸ هفته است، اما احتمال دارد در موارد شدیدتر دوره درمان بیشتر باشد.
- این محصول دارویی باید در جای خشک و خنک نگهداری شود. از ایجاد یخ‌زدگی در این دارو جدا خودداری بفرمایید. دمای پایین‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد برای نگهداری این دارو مناسب است.
- تمام محصولات دارویی باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- بسته‌های نکسیفارم ۲۸ عددی بوده و در بلیستر ۱۴ تایی توزیع می‌گردد.
- اس امپرازول می‌تواند سبب افزایش وزن شود.
- نکسیفارم ایجاد وابستگی نمی‌کند و جزء مواد مخدر محسوب نمی‌شود، اما باید دقت داشت مدت زمان استفاده از این دارو فقط به تشخیص پزشک باید باشد.
- استفاده طولانی مدت اس امپرازول احتمال دارد برخی عوارض جانبی را به همراه داشته باشد، برای مثال کاهش جذب مواد مغذی (مثلاً کلسیم و منیزیم)، افزایش خطر عفونت‌ها، و مشکلات کلیوی. پزشک شما ممکن است نیاز به رصد روتین شرایط سلامت شما داشته باشد تا مطمئن شود که مصرف دارو برای شما ایمن است.

- با توجه به اینکه جذب ویتامین ب ۱۲، کلسیم و منیزیم هم‌زمان با مصرف اس امپرازول کم می‌شود، بهتر است طبق نظر پزشک مکمل‌های غذایی نیز مصرف بفرمایید.
- اثرگذاری اس امپرازول می‌تواند از چند ساعت تا چند روز متغیر باشد، بهترین راه‌کار پیروی از دستورات پزشک بوده و تا پایان دوره درمان باید نکسیفارم را استفاده کرد.
- از آنجایی که اس امپرازول به منظور درمان بسیاری از مشکلات گوارشی تجویز می‌شود، معمولاً دوزهای متفاوت آن توصیه می‌گردد. قطعاً میزان دوز مصرفی فقط توسط پزشک متخصص اعلام خواهد شد اما به طور کل GERD ۲۰ تا ۴۰ میلی‌گرم در روز، زخم معده و اثنی عشر ۴۰ میلی‌گرم در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته و سندرم زولینگر-الیسون ۴۰ تا ۱۶۰ میلی‌گرم در روز تجویز می‌شود.
- اس امپرازول اسید معده را خنثی نخواهد کرد بنابراین برای بهبود سریع سوزش معده مناسب نیست.
- در بسیاری از مواقع درد معده و درد قلب اشتباه گرفته می‌شود، لازم است قبل از مصرف اس امپرازول از علت بروز درد به کمک متخصص اطمینان حاصل بفرمایید.
- معمولاً بهترین زمان برای استفاده از نکسیفارم (نیم الی یک ساعت) قبل از صبحانه است.
- با توجه به اینکه عوارض اس امپرازول می‌تواند گیجی و خواب‌آلودگی باشد، بهتر است از کار با ماشین‌آلات پرهیز کنید.
- در صورتی که زمان انقضا داروی اس امپرازول به اتمام رسیده با مشورت دکتر داروساز این محصول را به خوبی امحا کنید. از توصیه این محصول به اشخاص دیگر جدا خودداری بفرمایید چرا که این دارو فقط با توجه به شرایط فعلی شما تجویز شده است.

نتیجه‌گیری

یکی از انواع داروهای شرکت داروسازی کیش مدیفارم اس امپرازول بوده که با نام تجاری کپسول نکسیفارم در دوز ۴۰ میلی‌گرم و ۱۴ عدد تولید می‌شود. این محصول دارویی به منظور درمان و کنترل مشکلات گوارشی تجویز شده و می‌تواند به عنوان تک درمانی و درمان‌های ترکیبی محسوب شود.

از مشهورترین نام‌های این دارو نکسیوم بوده که در شرکت آسترانکا تولید در سال ۲۰۰۱ تولید شد.

به یاد داشته باشید تمام توصیه‌های اعلام شده صرفاً به منظور آگاهی بیشتر از دارو و معرفی اس امپرازول بوده و تحت هیچ شرایطی بر دستورات پزشک متخصص ارجحیت نخواهد داشت.

Kishmedipharma