

گروه

Ida Jalali

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که قرص داپوکستین چیست؟ حتما تا پایان این مطلب همراه ما باشید. داروی داپودکس هیدروکلراید جزو خانواده مهارکننده‌های باز جذب سروتونین SSRI به شما می‌رود و به منظور داروی اورولوژیک هم کاربرد دارد.

این محصول دارویی به شکل قرص داپودکستین ۳۰ میلی‌گرم در شرکت داروسازی کیش‌مدیفارم تولید و عرضه شده است. از قرص داپوکستین تحت عنوان داروی تاخیری نیز نام برده می‌شود و با تجویز پزشک در داروخانه‌های سراسر کشور قابل خرید و تهیه است.

مکانیسم عمل قرص داپودکس

نحوه تاثیرگذاری داروها در بدن را مکانیسم عمل می‌گویند. قرص داپوکستین با اثرگذاری بر روی گیرنده‌های مغز و مهار بازجذب سروتونین سبب افزایش غلظت سروتونین در سیناپسی خواهد شد. افزایش سطح سروتونین در نواحی مربوط به کنترل انزال، به بهبود زمان و کنترل انزال کمک می‌کند. قرص داپودکس همچنین ممکن است با کاهش اضطراب و استرس روانی، که می‌تواند در زودانزالی نقش داشته باشد، به بهبود این مشکل کمک کند. برای بسیاری از افراد این سوال پیش آمده که، قرص داپوکستین چند دقیقه تاخیر دارد و بعد از چند دقیقه اثر می‌گذارد؟ این دارو دارای اثربخشی سریع بوده و نهایتاً تا ۳ ساعت بعد از استفاده اثر خواهد کرد، همچنین نیمه عمر حدود ۴۵ دقیقه دارد که نسبتاً کوتاه بوده و در نتیجه خطر عوارض جانبی طولانی مدت را کاهش می‌دهد.

شرایط و موارد مصرف dapoxetine قرص

قرص داپوکستین (قرص داپودکس) که توسط پزشک متخصص و معالج تجویز می‌شود، موارد مصرف خاصی دارد که در ادامه به طور مختصر به آن‌ها خواهیم پرداخت:

- داپوکستین قرص برای درمان زودانزالی در آقایان به تجویز پزشک انجام می‌شود. زودانزالی به معنی ارگاسم پیش از شروع رابطه جنسی و یا در ابتدای آن است. این محصول دارویی همراه با یک لیوان پر از آب مصرف شده و می‌توانید همراه با غذا نیز میل بفرمایید. در واقع بسیاری از آن تحت عنوان قرص تاخیری داپوکستین یاد می‌کنند.
- مصرف قرص داپودکس در آقایان بین ۱۸ الی ۶۴ سال توصیه می‌شود.
- با توجه به اثرگذاری سریعی که دارد معمولاً ۱ الی ۳ ساعت قبل از شروع رابطه باید میل شود و از قرص داپوکستین ۳۰ میلی‌گرم شروع شده که در صورت تشخیص پزشک افزایش دوز نیز پیشنهاد خواهد شد و از دوز قرص داپوکستین ۶۰ میلی‌گرم استفاده می‌شود.
- داپوکستین قرص به عنوان یک داروی خط اول برای درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) تجویز می‌شود. این دارو به کاهش علائم اضطراب و نگرانی‌های مزمن کمک خواهد کرد.
- قرص داپودکس به منظور کاهش حمله‌های پانیک و اضطراب همراه با آن استفاده می‌شود. این دارو اثرات ضد اضطرابی و آرام‌بخشی دارد که به بهبود علائم اختلال پانیک کمک می‌کند.
- قرص داپوکستین با توجه به مکانیسم عملی که دارد منجر به کاهش دفعه‌های انزال خواهد شد.

طولانی‌تر شدن زمان انزال و کمتر شدن دفعات انزال در آقایان می‌تواند سبب افزایش رضایت جنسی و بهبود عملکرد جنسی شود که بهبود این موارد با تشخیص پزشک با قرص داپوکستین قابل دستیابی است.

موارد منع مصرف قرص داپوکستین | قرص داپودکس

اگرچه داروها به منظور بهبود سطح سلامت جسمانی و روانی افراد فرموله می‌شوند اما ممکن است برای تمام افراد مناسب نباشد. معمولاً خواندن جعبه و بروشور داخل جعبه می‌تواند کمک زیادی برای افزایش اطلاع از دارو و نکات مهم آن باشد. اما قرص داپودکس را چه اشخاصی نباید استفاده کنند؟ در چه شرایطی این محصول دارویی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؟ در اینجا به موارد منع مصرف قرص داپوکستین خواهیم پرداخت:

- فرد با اختلالات روانی نظیر افسردگی مازور یا حد، اختلال دو قطبی یا بایوپولار و اسکیزوفرنی
- داشتن سابقه مانیا (هیجان مفرط، تحریک‌پذیری و عدم تمرکز فکری)
- حساسیت به مواد قرص داپوکستین و یا اجزا سازنده آن
- مصرف هم‌زمان لینزولید، لیتیموم، ترامادول، الکل، LSD، بنزودیازپین و آپریتانت
- اشخاص مبتلا به بیماری‌های کلیوی متوسط تا شدید
- افراد با مشکلات و ناراحتی‌های قلبی نظیر آریتمی
- فرد دارای گلوکوم (مشکلات مربوط به چشم)
- در صورت نارسایی شدید و متوسط کبدی
- داشتن سابقه تشنج، غش و صرع
- دارای مشکلات انعقاد خون
- خانم‌های باردار و شیرده
- کودکان و نوجوانان

تداخلات دارویی قرص داپودکس | قرص داپوکستین

داروهایی که در حال مصرف آن هستید، از مهم‌ترین مواردی است که باید قبل از شروع مصرف هر نوع دارو با پزشک معالج خود در میان بگذارید. تداخلات دارویی می‌تواند بر اساس عوامل متفاوتی رخ دهد از جمله: اثرات فارماکودینامیک، مکانیسم اثر دارویی، ویژگی‌های فیزیوشیمیایی، عوامل فردی و بالینی، متابولیسم و دفع دارویی. در ادامه به برخی از رایج‌ترین عواملی که سبب بروز تداخلات دارویی قرص داپوکستین می‌شود، پرداخته‌ایم:

- مهارکننده‌های قوی CYP3A4 (اریترومایسین، کتوکونازول و ریتوناویر)
- داروهای مهارکننده PDE5 (تادالافیل، سیلدنافیل و ویاگرا)
- محصولات دارویی ضد انعقاد خون (وارفارین)
- مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIs)
- برخی داروهای گیاهی (عرق بادرنجوبیه)
- الکل و تمام مشتقات مشروبات الکلی
- برخی از داروهای ضد افسردگی SSRI مثل سرتراپین و فلوکستین
- داروهای ضد صرع (فنی‌نوئین)

- مهارکننده‌های COMT
- میوه گریپ فروت

تداخلات دارویی قرص داپودکس، طیف وسیعی از اثرات را شامل می‌شوند و میزان خطر آن‌ها بسته به موقعیت بالینی متفاوت است. نقش پزشک در شناسایی و مدیریت این تداخلات بسیار مهم است.

عوارض مصرف dapoxetine قرص

عوارض ایجاد شده می‌تواند براساس میزان دوز مصرفی دارو، تداخلات دارویی و نوع دارو، مدت زمان مصرف دارو، سن، جنسیت، شرایط سلامتی و شرایط بیماری‌های زمینه‌ای، حساسیت، عوامل ژنتیکی و نحوه مصرف دارو باشد. از جمله شایع‌ترین عوارض مصرف dapoxetine قرص می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

- تغییرات فشار خون
- سندرم سروتونین
- خواب‌آلودگی و بی‌حالی
- تهوع، سردرد و سرگیجه
- اختلال در خواب و مشکل خواب
- تاری دید و بروز مشکل در بینایی
- یبوست، اسهال و مشکلات گوارشی
- تعریق بیش از اندازه و خشکی دهان
- آریتمی، کاهش و یا افزایش ضربان قلب
- سوء هاضمه، بی‌میلی به غذا و بی‌اشتهایی شدید
- ایجاد واکنش‌های آلرژیک (مانند بثورات پوستی، خارش، تورم)

نکاتی در مورد قرص داپودکس

همان‌طور که تا اینجا گفته شد قرص داپودکس یک داروی تجویزی به منظور درمان زودانزالی در آقایان است. مصرف صحیح این دارو می‌تواند اثربخشی آن را افزایش داده و از بروز عوارض جانبی جلوگیری کند. در زیر، نکاتی در مورد نحوه مصرف قرص داپوکستین آورده شده است:

- از مصرف بیش از اندازه دوز توصیه شده، خودداری بفرمایید.
- قرص داپودکس به هیچ عنوان نباید جویده شود.
- لیست کاملی از داروها، مکمل و گیاهانی که در حال مصرف هستید باید به پزشک اعلام شود.

- از آن جایی که قرص داپودکس می‌تواند سبب سرگیجه و خواب‌آلودگی شود، بهتر است در زمانی که نیاز به تمرکز دارید (کار با ماشین آلات خطرناک، رانندگی و مطالعه) از آن استفاده نفرمایید.
 - Dapoxetine قرص ممکن است باعث عوارضی مانند سردرد، دل‌پیچه و خستگی شود، در صورت طولانی و تشدید این علائم حتماً با پزشک معالج خود در تماس باشید.
 - دوز مصرفی قرص داپوکستین نباید بیش از ۶۰ میلی‌گرم در یک روز باشد.
 - در صورت فراموشی دوز قرص داپودکس، به محض یادآوری آن را استفاده نفرمایید و اگر به زمان مصرف دوز بعدی خود نزدیک هستید، دوز فراموش شده را مصرف نکنید و به برنامه مصرف منظم خود ادامه دهید.
 - Dapoxetine قرص باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از نور آفتاب نگهداری شود.
 - قرص داپودکس فقط باید با نسخه پزشک مصرف شود.
 - قرص داپوکستین ایجاد وابستگی نمی‌کند و یک داروی اعتیادآور به شمار نمی‌آید.
 - مصرف قرص داپوکستین، اثر ضد بارداری ندارد.
 - در صورت بروز عوارض جانبی شدید یا عدم پاسخ مناسب به این محصول دارویی، باید با پزشک مشورت شود.
 - مصرف قرص داپودکس به صورت روزانه نیست و فقط در صورت نیاز تجویز می‌شود.
 - مصرف الکل همراه با داپوکستین می‌تواند خطر عوارض جانبی مانند سرگیجه، خواب‌آلودگی و غش را افزایش دهد. توصیه می‌شود از مصرف الکل در زمان استفاده از این دارو خودداری کنید.
 - استفاده از قرص داپودکس از عفونت‌های مقاربتی (STIs) محافظت نمی‌کند.
- مصرف قرص داپودکس برای کوتاه مدت بوده و در صورت نیاز به استفاده طولانی مدت، حتماً با پزشک متخصص مشورت نفرمایید.

نتیجه‌گیری

قرص داپوکستین ۳۰ میلی‌گرم در داروسازی کیش مدیفارم تولید و عرضه می‌شود. این محصول دارویی با نام قرص داپودکس شناخته شده و در واقع نام تجاری همان قرص داپوکستین بوده و بیشتر به منظور درمان زود انزالی برای آقایان به تجویز پزشک متخصص توصیه می‌شود. توجه به موارد منع مصرف و تداخلات دارویی از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی به شمار می‌رود که پیش از استفاده قرص داپوکستین باید در نظر داشته باشید. قرص تاخیری داپوکستین می‌تواند تا ۴۵ دقیقه ماندگاری داشته باشد و بهتر است ۱ الی ۳ ساعت قبل از شروع رابطه جنسی مصرف شود.

لازم به ذکر بوده، تمام موارد یاد شده به منظور افزایش سطح آگاهی جامعه است و به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین توصیه‌های پزشک متخصص باشد، بنابراین از مصرف خودسرانه هرگونه دارو از جمله قرص داپودکس جدا خودداری نفرمایید.

Kishmedipharma