

بی پریدن

قرص پیوسته رهش بی پریدن هیدروکلراید ۲ و ۴ میلی گرم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

مکانیسم عمل

- نحوه دقیق عمل این دارو مشخص نیست، اما گمان می رود که این دارو به طور نسبی گیرنده های کولینرژیک مرکزی را بلوک می کند و بنابراین موجب تعادل فعالیت کولینرژیک و دوپامینرژیک در گانگلیون های بازال می شود.

موارد مصرف

- درمان پارکینسون، علایم اکستراپیرامیدال ناشی از مصرف برخی داروها، حرکات غیر ارادی (آتتوز) مادرزادی و دژنراسیون هیپوتالتیکوکار

موارد منع مصرف

- در صورت مشکلات زیر، مزایای درمان باید نسبت به خطرات احتمالی سنجیده شود:

- آریتمی قلبی و ناپایداری سیستم قلبی-عروقی

- گلوکوم (با زاویه باز و زاویه بسته)

- نقص عملکرد کبدی

- افزایش فشار خون

- انسداد روده

- میاستنی گراویس

- هایپرتروفی پروستات متوسط تا شدید

- احتیاس ادرار

- نقص عملکرد کلیوی

- سابقه حساسیت به داروهای درمان کننده اختلالات حرکتی

عوارض جانبی

- ۱- عوارضی که در صورت بروز، نیاز به توجهات پزشکی دارند:

- عوارض یا شیوع نادر:

واکنشهای حساسیتی (جوش پوستی)، گیجی (به ویژه در سالمندان یا بیماران با دوز مصرفی بالا)، افزایش فشار داخل چشم.

- ۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه بروز یا ایجاد مزاحمت برای بیمار نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

- عوارض یا شیوع بیشتر:

اثرات آنتی کولینرژیک (تاری دید، بیوست، کاهش تعریق، احتیاس ادرار، دفع دردناک ادرار به ویژه در سالمندان، خواب آلودگی، خشکی دهان، بیثباتی یا گلو، افزایش حساسیت چشم ها به نور، حالت تهوع یا استفراغ)

موارد قابل توصیه

- به علت فعالیت جمعی، درمان باید با دوز پایین آغاز شود و دوز درمانی باید دریاژه ۵ یا ۶ روزه افزایش یابد.

- دارو را به مقدار توصیه شده توسط پزشک و نه بیشتر به همراه غذا میل کنید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن مصرف ننمایید و از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری ننمایید. (مگر اینکه ۴ ساعت یا کمتر

به دریافت دوز بعدی باقی مانده باشد)