

پیروکسیکام مدیفارم

پیروکسیکام

ژل موضعی ۵/۰ درصد

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

دسته دارویی

- ضد التهاب غیر استروئیدی

مکانیسم اثر

- این دارو با مهار فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز باعث کاهش تشکیل پروستاگلندین ها و ترومبوکسان ها از آراشیدونیک اسید و در نهایت کاهش درد و التهاب می گردد.

موارد قابل توصیه

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا داروهایی نظیر آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا پزشک مشورت شود.
- از تماس این دارو با چشم ها، سطوح مخاطی، زخم های باز، نواحی آسیب دیده و عفونی پوست خودداری کنید.
- از پانسمان کردن موضع، اجتناب گردد.
- این دارو فقط جهت استعمال خارجی است.

موارد مصرف

- آرتريت روماتوئید، سفتی مفاصل، استنوز آرتريت.

مقدار و نحوه مصرف

- حدود ۲-۱ گرم از ژل پیروکسیکام روزی ۳ بار روی موضع ماساژ داده شود تا جذب پوست گردد.
- پس از مصرف ژل، شستن دستها الزامی است .

موارد منع مصرف

- افراد با سابقه آسم یا حساسیتهای شدید آلرژیک نسبت به آسپرین و یا دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی.
- کودکان زیر ۱۲ سال.
- استفاده همزمان با دیگر اشکال دارویی پیروکسیکام.

عوارض جانبی

- اگر در سطح وسیعی از پوست مصرف گردد ممکن است عوارضی مانند سندرم شبه آنفلوانزا، عوارض گوارشی مانند گاستریت، تهوع و استفراغ ایجاد گردد.

- حساسیت به نور.

- واکنش های حساسیتی پوستی.

مصرف در دوران شیردهی و بارداری

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی بدون تشخیصی پزشک توصیه نمی شود.

شرایط نگهداری

- دارو در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از بجز زدگی محافظت گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

- تیوب ۵۰ گرمی همراه با برگه راهنما داخل جعبه